

richterpharma ag

Exagon[®]

400 mg/ml solución inyectable



laboratorios
Karizoo





Sustancia activa

1 ml contiene:
Pentobarbital sódico 400,0 mg

Indicaciones de uso

Eutanasia

Especies de destino

Equino, ponis, bovino, porcino, perros, gatos, visones, turones, liebres, conejos, cobayas, hámsteres, ratas, ratones, aves de corral, palomas, aves, serpientes, tortugas terrestres, lagartos, ranas.

Dosis:

- **Perros**
1 ml/3-4 kg (10 ml/30 kg)
- **Gatos**
1 ml/2-3 kg
- **Equino y Ponis:**
1 ml/4,5-5 kg (~100 ml/caballo)
- **Otras especies**
1 ml por 1 – 2 kg

Presentación

1x100 ml.



Exagon 400 mg/ml solución inyectable. Composición: Por ml: **Sustancia activa:** Pentobarbital sódico 400,0 mg (equivalente a 364,6 mg de pentobarbital). **Especies de destino:** Equino, ponis, bovino, porcino, perros, gatos, visones, turones, liebres, conejos, cobayas, hámsteres, ratas, ratones, aves de corral, palomas, aves, serpientes, tortugas terrestres, lagartos, ranas. **Indicaciones:** Eutanasia. **Posología y vía de administración:** La administración por vía intravenosa debe ser la vía de elección y se debe aplicar una sedación adecuada si el veterinario lo estima necesario. **Equino y ponis:** 1 ml por 4,5 – 5 kg peso vivo, por vía intravenosa como bolo rápido. **Perros: Administración por vía intravenosa:** inyección continua (aprox. 1,2 ml/s) hasta pérdida de consciencia, el resto administrado como bolo rápido: 1 ml por 3 – 5 kg peso corporal. **Administración por vía intracardiaca e intraperitoneal:** 1 ml por 3 – 4 kg peso corporal. **Gatos: Administración por vía intravenosa:** inyección continua hasta pérdida de consciencia, el resto administrado como bolo rápido: 1 ml por 2 – 3 kg peso corporal. **Administración por vía intracardiaca e intraperitoneal:** 1 ml por 1 – 2 kg peso corporal por vía intracardiaca con una cánula larga (aprox. 4 cm) inyectado en dirección craneal y ligeramente dorsal desde el esternón. **Liebres, conejos, cobayas, hámsteres, ratas, ratones:** 1 ml por 1 – 2 kg peso corporal por vía intravenosa, vía intracardiaca. 1 ml por 0,5 – 1 kg peso corporal por vía intraperitoneal. **Aves de corral, palomas, aves:** 1 – 2 ml por kg peso vivo por vía intravenosa. 1 – 2 ml por kg peso vivo por vía intrapulmonar. **Serpientes, tortugas terrestres, lagartos, ranas:** Dependiendo del tamaño del animal, inyectar de 0,5 a 1,0 ml en la cavidad torácica cerca del corazón; se espera la muerte tras 5 a 10 minutos. **Presentación:** 1 x 100 ml. **Titular de la autorización de comercialización:** Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Weis, Austria. **Reg. Núm.:** 2994-ESP. **Administración exclusiva por el veterinario.**