CATÁLOGO PRODUCTOS
KARIZOO 2020

KARIZOO

ANTIBIÓTICOS

CITRAMOX® 100 mg/g 4
Polvo para administración en agua de bebida en bovino, porcino y avicultura.
Amoxicilina

CITRAMOX® 500 mg/g 4
Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura, pavos y patos.
Amoxicilina

CITRAMOX® 1000 mg/g 5
Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura, pavos y patos.
Amoxicilina

ENROKARIZOO 20% (MX) 5
Solución oral para administración en agua de bebida para aves.
Enrofloxacina

FLORTEK 40 mg/ml 6
Premezcla medicamentosa para porcino
Florfenicol

FLORTEK® 100 mg/ml 6
Solución oral para administración en agua de bebida para porcino
Florfenicol

K-DOX 500 mg/g 7
Polvo para administración en agua de bebida o en leche
Doxiciclina

K-FLOX 100 mg/ml
ENROKARIZOO 10% (MX) 8
Solución oral para avicultura y cunicultura.
Enrofloxacina

KARENCOL SOLUBLE (MX) 9
Solución oral para administración en agua de bebida para aves.
Enrofloxacina + Colistina

KARIDOX 100 mg/ml 10
Solución oral para administración en agua de bebida para porcino y avicultura.
Doxiciclina

KARIDOX 125 mg/g 10
Premezcla medicamentosa para porcino.
Doxiciclina

KARIDOX 500 mg/ml 11
PPolvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura y pavos
Doxiciclina

KARIFLOR 8% (MX) 11
Premezcla medicamentosa para aves y porcino.
Florfenicol

KARIFLOR SOLUBLE 10% (MX) 12
Solución oral para administración en agua de bebida para porcino y aves.
Florfenicol

KARIFLOR 30% (MX) 12
Solución inyectable para porcino y bovino.
Florfenicol

KARIFLOX 5 mg/ml 13
Solución oral para porcinos.
Enrofloxacina

KARIFLOX 25 mg/ml 13
Solución oral para bovino
Enrofloxacina

KARIMOX 20% PREMIX (MX) 14
Premezcla medicamentos para aves y porcino.
Amoxicilina

KARIMOX 80% (MX) 15
Polvo para administrar en agua de bebida en aves y porcino.
Amoxicilina

KARIMULINA 10% PREMIX (MX) 16
Premezcla medicamentosa para porcino.
Tiamulina

KARIMULINA 125 mg/ml (EU)
KARIMULINA 12.5% (MX) 17
Solucion para administracion en agua de bebida
Tiamulina

KARITIL 30% INYECTABLE (MX) 18
Solución inyectable para bovino.
Tilmicosina

KARITIL ORAL (MX) 19
Solución oral para bovino, porcino y aves.
Tilmicosina

KARITIL PREMIX (MX) 20
Premezcla medicamentosa para porcino.
Tilmicosina

LINCO K 11% PREMIX (MX) 21
Premezcla medicamentosa para porcino.
Lincomicina

LINCOSOL 400 mg/g (EU)
LINCO-K 400 (MX) 22
Polvo para administración en agua de bebida.
Lincomicina

ANTICOCCIDIALES

TOLTRA-K 25 mg/ml (EU)
KARICOX 2,5% (MX).....23
Solución para agua de bebida en avicultura y pavos.
Toltrazurilo

KARICOX 5% (MX).....24
Suspensión oral para porcino y bovino.
Toltrazurilo

ANTIPARASITARIOS

KARIVER 1% (MX).....25
Solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino.
Ivermectina

HORMONALES

SINCRO K (MX).....26
Solución inyectable.
Agente luteolítico y sincronizador de celo.
D-Cloprostenol

ANESTÉSICOS

ISOFLUTEK® 1000 mg/g.....27
Líquido para inhalación del vapor.
Isoflurano

SEVOTEK® 1000 mg/g.....28
Líquido para la inhalación del vapor para perros y gatos.
Sevoflurano

AGENTES NEUROLÓGICOS

URISTOP® 40 mg/ml.....29
Jarabe para perros.
Hidrocloruro de fenilpropanolamina

NSAIDs

KETOPAIN® 300 mg/ml.....30
Solución para administración en agua de bebida para terneros y porcino.
Ketoprofeno

CITRAMOX® 100 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida en bovino, porcino y avicultura.

Amoxicilina



1 kg 100 g

COMPOSICIÓN
Amoxicilina 100 mg/g.
(equivalente a 114,78 mg de amoxicilina trihidrato).

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, avicultura.

DOSIS
10 mg /Kg p.v. cada 12 horas, durante 5 días consecutivos, (1 g /10 Kg p.v./cada 12 horas).
Si no se apreciara mejoría las primeras 48 horas reconsiderar el diagnóstico.
El agua medicada debe ser la única fuente de agua de bebida durante el periodo de tratamiento.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina. o usar en rumiantes con el rumen funcional. Las causadas por colibacilosis, salmonelosis (excepto en aves), estreptococias y estafilococias.

TIEMPO DE ESPERA
Bovino y terneros pre-rumiantes:
Carne: 2 días.

CITRAMOX® 500 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura, pavos y patos.

Amoxicilina



1 kg 400 g 200 g

COMPOSICIÓN
Amoxicilina 436 mg/g.
(equivalente a 500 mg de amoxicilina trihidrato).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos, patos.

DOSIS
20 mg/Kg p.v. (equivalente a 40 mg/Kg·p.v.) diariamente hasta un máximo de 5 días.
Tratamiento de pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Pollos: Carne: 1 día.
Patos: Carne: 9 días.
Pavos: Carne: 5 días.
Porcino: Carne: 2 días.
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 3 semanas desde el inicio de la puesta.

CITRAMOX® 1000 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura, pavos y patos.

Amoxicilina



1 kg 200 g

COMPOSICIÓN
Amoxicilina 871,2 mg/g.
(equivalente a 1.000 mg de amoxicilina trihidrato).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos, patos.

DOSIS
20 mg/Kg p.v. (equivalente a 20 mg/Kg·p.v./dia) hasta un máximo de 5 días. Administrar en el agua de bebida.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina.
Para el tratamiento de pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Pollos: Carne: 1 día
Patos: Carne: 9 días
Pavos: Carne: 5 días
Porcino: Carne: 2 días
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 3 semanas desde el inicio de la puesta.

ENROKARIZOO 20% (MX)

Solución oral para administración en agua de bebida para aves.

Enrofloxacina



20 L 5 L 1 L 250 ml

COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 200 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Aves (broilers).

DOSIS
Administrar por vía oral en el agua de bebida. Pollos de engorda: 25ppm en el agua de bebida (0.25L de Enrokarizoo 20% por litro de agua) equivalente a 10mg de enrofloxacina / kg pv / día. Duración del tratamiento: 3 – 5 días. Si no existe mejora en los tres días siguientes de iniciada la terapia, puede estar indicado un cambio en la terapia escogida. Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua. Renovar el agua medicada cada día.

INDICACIONES
Pollos de engorda: Tratamiento de infecciones causadas por *E. coli, Salmonella spp.* y *Mycoplasma spp.*

OTRAS INDICACIONES:
Consumir como máximo 3 meses tras la apertura del envase original. Validez del agua medicada: 24 horas. Conservar en lugar fresco y seco, protegido de la luz

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 4 días

FLORTEK 40 mg/g

Premezcla medicamentosa para porcino.

Florfenicol

25 kg

COMPOSICIÓN
Florfenicol 40 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
10 mg/Kg p.v./día (equivalente a 250 mg/kg p.v./día de premezcla medicamentosa), administrado durante 5 días.

INDICACIONES
Tratamiento y metafilaxis de la enfermedad respiratoria porcina causada por *Pasteurella multocida* sensible a florfenicol. Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en la piara antes del tratamiento metafiláctico.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 14 días.

FLORTEK® 100 mg/ml

Solución oral para administración en agua de bebida para porcino

Florfenicol



5 L 1 L 500ml

COMPOSICIÓN
Florfenicol 100 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
Administración en agua de bebida. 10 mg de florfenicol por kg de peso vivo por día en agua de bebida durante 5 días consecutivos.

INDICACIONES
Aves (engorda y reproductoras) y porcino: Para la prevención y tratamiento de enfermedades susceptibles a la fórmula. Actinobacilosis. Complejo Respiratorio Porcino. Pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 20 días.

K-DOX 500 mg/g

Polvo para administración
en agua de bebida o en leche

Doxiciclina



COMPOSICIÓN
Doxiciclina (hiclato) 500 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Cerdos de engorde, pollos de engorde, terneros prerrumiantes.

DOSIS
Pollos de engorde: 8,6 – 17,2 mg de hiclato de doxiciclina/kg de peso vivo/día, equivalente a 17,2 – 34,4 mg de medicamento veterinario por kg de peso vivo/día, durante 3-5 días consecutivos.
Cerdos de engorde: 11,5 mg de hiclato de doxiciclina/kg de peso vivo/día, equivalente a 23 mg de medicamento veterinario por kg de peso vivo/día, durante 5 días consecutivos.
Terneros prerrumiantes: Administración por vía oral disuelto en leche deberá emplearse inmediatamente a una dosis de 11,5 mg de hiclato de doxiciclina/kg de peso vivo/día, equivalente a 23 mg de medicamento veterinario por kg de peso vivo/día, durante 5 días consecutivos.

INDICACIONES
Cerdos de engorde: Tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio porcino, causados por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina tales como *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae*.
Pollos de engorde: Tratamiento de infecciones causadas por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina tales como *Escherichia coli* (colibacilosis) o *Mycoplasma gallisepticum* (Síndrome Respiratorio Crónico).
Terneros prerrumiantes: Tratamiento de infecciones respiratorias causadas por cepas bacterianas sensibles a la doxiciclina, tales como *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica*.

TIEMPO DE ESPERA
Bovino (terneros):
Carne: 7 días
Leche: Su uso no está autorizado en animales en lactación cuya leche se utiliza para el consumo humano.
Porcino (cerdos de engorde):
Carne: 2 días
Aves (pollos de engorde):
Carne: 7 días.
Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en un plazo de 4 semanas desde el inicio de la puesta.

K-FLOX 100 mg/ml (EU)
ENROKARIZOO 10% (MX)

Solución oral para avicultura y cunicultura.

Enrofloxacina



5 L (EU-MX) | 1 L (EU-MX) | 250 ml (EU-MX)

COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 100 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Avicultura, cunicultura.

DOSIS
Administrar por vía oral en el agua de bebida. Pollos de engorda: 50 ppm en el agua de bebida (0.5 ml de Enrokarizoo 10% por litro de agua) equivalente a 10 mg de enrofloxacina / kg pv / día. Duración del tratamiento: 3 – 5 días. Si no existe mejora en los tres días siguientes de iniciada la terapia, puede estar indicado un cambio en la terapia escogida. Debido a la forma de administración, y a que el consumo de agua depende de la condición clínica del animal, para asegurar una dosificación correcta, la concentración del antimicrobiano será ajustada teniendo en cuenta el consumo diario de agua.

INDICACIONES
Pollos de engorda: Tratamiento de infecciones causadas por *E. coli*, *Salmonella spp.* y *Mycoplasma spp.*

TIEMPO DE ESPERA
Pollos (UE):
Carne: 4 días
Huevos: No administrar a gallinas ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano
Conejos (UE):
Carne: 2 días.
Pollos (UE):
Carne: 7 días.
Huevos: No administrar a gallinas ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano. No usar en ponedoras de reposición en los 14 días previos al inicio de la puesta.

KARENCOL SOLUBLE (MX)

Solución oral para administración en agua de bebida para aves.

Enrofloxacina/Colistina



COMPOSICIÓN

Enrofloxacina 100 mg/ml.
Colisitina sulfato 50 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Aves (Pollo de engorde y pavos).

DOSIS

Administrar vía oral, en el agua de bebida. Karencol Soluble se administra en una concentración de 0.1ml/kg p.v. por 3 a 5 días (Enrofloxacina 10mg/kg y colistin sulfato 5mg/kg). Recomendaciones para el manejo del producto: Teniendo en cuenta que el 10% del contenido de la botella es enrofloxacina y que el 5% del contenido de la botella es colistina sulfato.

$$\text{cantidad de karencol soluble (por 1000 litros de agua)} = \frac{\text{número de animales x peso promedio de un animal (en Kg) x 100}}{\text{consumo total de agua por instalación en el día anterior (en litros)}}$$

INDICACIONES

Karencol Soluble es una solución antimicrobiana de amplio espectro recomendada para administración oral en el agua de bebida de pollos y pavos, para el tratamiento de enfermedades respiratorias, intestinales y de infecciones sistémicas causadas por gérmenes sensibles a la combinación de la enrofloxacina y de la colistina sulfato. Está indicado para el uso en los casos de: Enfermedad respiratoria crónica (*Mycoplasma gallisepticum*, *E.coli*). Enfermedad de los sacos aéreos (*Mycoplasma meleagridis*). Sinovitis infecciosa (*Mycoplasma synoviae*). Colibacilosis (*E.coli*). Salmonelosis (*Salmonella spp.*). Cólera aviar (*Pasteurella multocida*) · Bordetellosis en pavos (*Bordetella avium*). Coriza aviar (*Haemophylus paragallinarum*). Erisipelas (*Erysipelothrix rhusipathiae*) · Staphylococcosis (*Staphylococcus aureus*) · Clamidiosis (*Chlamydia psittaci*).

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 28 días
Vísceras y derivados: No consumir vísceras ni derivados de estos animales durante los 28 días posteriores al tratamiento.

KARIDOX 100 mg/ml

Solución oral para administración en agua de bebida para porcino y avicultura.

Doxiciclina



5 L 1 L

COMPOSICIÓN
Doxiciclina 100 mg/ml.
(equivalente a doxiciclina hiclato 116,0 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura.

DOSIS
11.5 mg/Kg p.v./día, equivalente a 0,1 ml/Kg p.v., durante 5 días consecutivos.
Administración por vía oral, en agua de bebida.

INDICACIONES
Prevención de enfermedades del tracto respiratorio sensibles a la doxiciclina. Enfermedades del tracto respiratorio causadas por *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibles a la doxiciclina. Previamente al tratamiento, debe asegurarse la presencia de enfermedad en la piara.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 7 días

KARIDOX 125 mg/g

Premezcla medicamentosa para porcino.

Doxiciclina

25 kg

COMPOSICIÓN
Doxiciclina (hiclato) 125 mg/g.
(como hiclato de doxiciclina 144,2 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
10-12 mg /Kg p.v./día, equivalente a una dosis de 80-95 mg / Kg p.v./día. La tasa recomendada de incorporación en pienso sería de 2 Kg por cada 1.000 Kg de alimento. El tratamiento debe continuarse durante 8 días. Vía oral, en el alimento.

INDICACIONES
Tratamiento y metafilaxis de pleuroneumonía causada por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* sensibles a la doxiciclina. La presencia de la enfermedad en el ganado debe estar establecida antes de su uso.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 5 días

KARIDOX 500 mg/ml

Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura y pavos

Doxiciclina



1 kg 200 g

COMPOSICIÓN
Doxiciclina 500 mg/g.
(equivalente a Doxiciclina hiclato 580,0 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos.

DOSIS
23,1 mg/Kg p.v./día (equivalente a 40,0 mg/Kg p.v./día), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas por cepas sensibles a la doxiciclina.
Tratamiento de *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles a la doxiciclina.

TIEMPO DE ESPERA
Porcino: Carne: 4 días
Aves (Pollos): Carne: 5 días
Aves (Pavos): Carne: 12 días

KARIFLOR 8% (MX)

Premezcla medicamentosa para aves y porcino.

Florfenicol



20 kg 10 kg 5 kg

COMPOSICIÓN
Florfenicol 80 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino (engorde y reproductoras).

DOSIS
Via de administración: Oral, mezclado en el alimento a dosis de 15-50 ppm, que equivale a 187.5- 625 g/1000 Kg de alimento, durante 14 días.

INDICACIONES
Porcino (engorde y reporoductoras) para el tratamiento de infecciones respiratorias bacterianas como: *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus*, *Bordetella bronchiseptica*, *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*. Para el control de ileitis porcina y meningitis por *Streptococcus*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne y Vísceras: 2 días

KARIFLOR SOLUBLE 10% (MX)

Solución oral para administración en agua de bebida para porcino y aves.

Florfenicol



5 L 1 L

COMPOSICIÓN
Florfenicol 100 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Aves y Porcino.

DOSIS
Aves: (pollo de engorda) 20 mg de florfenicol/Kg pv/día, durante 3 a 5 días.
Porcino: 20 mg de florfenicol/Kg pv/día durante 5 días.

INDICACIONES
Aves (engorda y reproductoras) y porcino: Para la prevención y tratamiento de enfermedades susceptibles a la fórmula. Actinobacilosis. Complejo Respiratorio Porcino. Pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Aves:
Carne: 5 días
Huevos: No administrar a gallinas ponedoras cuyos huevos se destinen al consumo humano
Porcino:
Carne: 16 días.

KARIFLOR 30% (MX)

Solución inyectable para porcino y bovino.

Florfenicol

250 ml 100 ml

COMPOSICIÓN
Florfenicol 300 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS
Bovino: Vía SC: 40mg / kg p.v. (2ml / 15 kg) administrado una sola vez. En la musculatura del cuello. El volumen de dosis dado en cualquier punto de inyección no debe exceder de 10 ml.
Ovino y Caprino: Dosis única 20 mg /kg IM cada 48 hrs. Al aplicar más de dos dosis, la primera es vía IM, las siguientes vía SC. Se recomienda aplicar únicamente bajo vigilancia médica.
Porcino: Vía IM. 15 mg/kg p.v. (1ml/ 20 kg) proporcionar 2 aplicaciones con un intervalo de 48 hrs. en la musculatura del cuello. El volumen de la dosis no debe exceder a 5 ml.

INDICACIONES
Para el tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con bacterias susceptibles al florfenicol como *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Haemophilus somnus* y *Actinobacillus pleuropneumoniae* en bovino, ovino, caprino y porcino; así como para el tratamiento de la pododermatitis bovina causada por *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne y vísceras: 2 días

KARIFLOX 5 mg/ml

Solución oral para porcinos.

Enrofloxacina

250 ml
Bomba dosificadora de 1 ml

COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 5 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
5 mg / 3 Kg p.v. /día. equivalente a 1 ml/ 3 Kg p.v. /día, por un período de tratamiento de 3 a 5 días.

INDICACIONES
En lechones (hasta 10 Kg): Tratamiento de infecciones gastrointestinales, como las producidas por *Escherichia coli*. Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o las pruebas de sensibilidad indiquen la enrofloxacina como fármaco de elección.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 10 días.

KARIFLOX 25 mg/ml

Solución oral para bovino.

Enrofloxacina



5 L 1 L 500ml 250ml

COMPOSICIÓN
Enrofloxacina 25 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino.

DOSIS
La dosis es de 5 mg/Kg p.v./día equivalente a 10 ml/50 Kg p.v./ día durante 5 días. Administrar en lactoreemplazante o agua de bebida.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones respiratorias producidas por *Pasteurella multocida* y *Manheimia haemolytica*. Infecciones gastrointestinales producidas por *Escherichia coli*. Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o las pruebas de sensibilidad indiquen el enrofloxacino como fármaco de elección.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 11 días.

KARIMOX 20% PREMIX (MX)

Premezcla medicamentos para aves y porcino.

Amoxicilina



25 kg 20 kg 10 kg

COMPOSICIÓN
Amoxicilina (trihidrato) 200 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Aves (pollo de engorde/broiler) y porcino.

DOSIS
Vía oral, mezclado con el alimento.
Porcino: 15 a 25mg de amoxicilina/kg de peso vivo durante 5 días (equivalente a 75 - 125mg de Karimox 20% Premix / kg de peso vivo). - 1 a 2kg de Karimox 20% Premix por tonelada de alimento terminado.
Aves (broiler): 15 a 30mg de amoxicilina/kg de peso vivo durante 5 días (equivalente a 75 - 150 mg de Karimox 20% Premix / kg de peso vivo). - 1 a 2 kg de Karimox 20% Premix por 1000 kg de alimento terminado.

INDICACIONES
Karimox 20% Premix es un antibiótico semisintético perteneciente al grupo de las penicilinas. Tiene una acción bactericida basada en la inhibición de la síntesis de péptidos, un componente esencial de la pared celular de la bacteria. El espectro de acción de Karimox 20% Premix resulta en numerosos microorganismos Gram-positivos y Gram-negativos como por ejemplo: *Streptococcus spp.*, *Diplococcus spp.*, *Corinebacterium spp.*, *Staphilococcus aureus*, *Haemophilus pneumoniae*, *Haemophilus spp.*, *Listeria monocytogenes*, *Bordetella pertussis*, *Neisseria spp.*, *Escherichia coli*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Proteus mirabilis*.

TIEMPO DE ESPERA
Porcino:
Carne: 5 días
Aves:
Carne: 1 día
Huevos: evitar consumo de huevos procedentes de aves tratadas.

KARIMOX 80% (MX)

Polvo para administrar en agua de bebida en aves y porcino.

Amoxicilina



1 kg 250 g

COMPOSICIÓN
Amoxicilina trihidrato 800 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Aves (broilers, reproductoras y ponedoras) y porcino.

DOSIS
Vía de administración: Oral, en el agua de bebida.
Aves (de engorda, reproductoras y de postura), pavos y cerdos: 10 a 20mg/kg de peso vivo por día. O bien: 8 a 16 mg por kg de Amoxicilina trihidratada por 3 días consecutivos. La dosis deberá aplicarse unicamente bajo prescripcion y vigilancia del medico veterinario. Aves 0-4 semanas de edad 6-12g Karimox/100 litros diarios. Aves + de 4 semanas de edad 10 a 20g Karimox/100 litros diarios. Cerdos 0-4 meses de edad 10 a 20g Karimox/100 litros diarios. Cerdos + de 4 meses de edad 15 a 30g Karimox/100 litros diarios.

INDICACIONES
Karimox 80% polvo soluble está elaborado a base de amoxicilina trihidrato indicado para el control y tratamiento de infecciones sistémicas del aparato respiratorio, digestivo y urogenital causadas por gérmenes sensibles a la amoxicilina, así como a los gérmenes sensibles a la penicilina tales como: *Staphylococcus spp.*, *Streptococcus spp.*, *Pasteurella spp.*, *Clostridium spp.*, *Salmonella spp.*, *Haemophilus spp.* y *Escherichia coli*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 15 días
Huevos: no se precisa.

KARIMULINA 10% PREMIX (MX)

Premezcla medicamentosa para porcino.

Tiamulina



25 kg 10 kg

COMPOSICIÓN
Tiamulina hidrógeno fumarato 100 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
Administración por vía oral, en el alimento balanceado
Dosis recomendada: Tratamiento disentería porcina:
Mezclar 1kg de Karimulina 10% Premix (equivalente a 100 g de tiamulina hidrógeno fumarato) por 1000 kg de alimento balanceado y administrarlo durante 7-10 días.

INDICACIONES
Para el tratamiento oral y prevención de la disentería porcina causada por Serpulina (*Treponema hyodysenteriae*) complicada por *Fusobacterium spp.* y *Bacteroides spp.*

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días

KARIMULINA 125 mg/ml (EU)

KARIMULINA 12.5% (MX)

Solucion para administracion en agua de bebida

Tiamulina

COMPOSICIÓN
Tiamulina hidrógeno fumarato 125 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino y aves: pollos y pavos.

DOSIS
Porcinos: 8.8 mg de Tiamulina hidrógeno fumarato por kg p.v. y día; equivale a 10 ml de solución por 142 kg p.v., administrado en el agua de bebida durante 3 a 5 días. Para asegurar la ingestión de 8.8 mg/kg por día, el producto se debe administrar de alguna de las siguientes maneras: (i) Administrar en aproximadamente la mitad de los requerimientos de agua diaria, para asegurar el consumo de la dosis correcta. El agua no medicada debe proporcionarse cada día después de que se haya consumido el agua medicada. La proporcion es de 10 ml de solución por 142 kg de peso vivo. (ii) Administración continúa a un nivel de 60 ppm de principio activo en el agua de bebida, como única fuente de agua de bebida. Las necesidades diarias deben ser añadidas al agua de bebida a una ratio de 9.6 ml de solución por 20 litros de agua. Si no hay respuesta al tratamiento dentro de 5 días, se debe re-establecer el diagnóstico
Aves:Pollos y pavos: 25 mg de Tiamulina hidrógeno fumarato por kg p.v. / día (equivalente a 100 ml de solución por 500 kg p.v.) administrado en agua de bebida durante 3 a 5 días. Para asegurar ésta dosis, la tiamulina debe ser administrada a 0.025% en el agua de bebida (2ml de producto por litro de agua) durante 3 a 5 días.

INDICACIONES
Para el tratamiento oral y prevención de la disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae* y complicada con *Fusobacterium spp.* y *Bacteroides spp.* Pollos y pavos; para reducir la gravedad de la enfermedad causada por *Mycoplasmas*

TIEMPO DE ESPERA
Pollos (EU):
Carne: 6 días
Huevos: Cero días
Pollos (MX):
Carne: 10 días
Huevos: No autorizado el uso en aves productoras de huevo para consumo humano.
Pavos (EU):
Carne: 6 días
Huevos: Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.
Pavos (MX):
Carne: 10 días
Huevos: No autorizado el uso en aves productoras de huevo para consumo humano.
Porcino (EU): Carne: 6 días
Porcino (MX): Carne: 10 días



KARITIL 30% INYECTABLE (MX)

Solución inyectable para bovino.

Tilmicosina

250 ml 100 ml

COMPOSICIÓN
Tilmicosina 300 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino.

DOSIS
Administrar una dosis subcutánea de 1 ml por 30 kg de peso vivo. La inyección se sugiere aplicar por debajo de la piel entre los hombros y por arriba de las costillas. No inocular más de 25 ml en el mismo sitio de aplicación.

INDICACIONES
Karitil 30% Inyectable tiene una actividad predominante contra agentes Gram (+) , algunos Gram (-) y *Mycoplasmas*. Está indicado para el tratamiento de la neumonía asociada a *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida* y otros organismos susceptibles a la tilmicosina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 28 días.

KARITIL ORAL (MX)

Solución oral para bovino, porcino y aves.

Tilmicosina



5 L 1 L

COMPOSICIÓN

Contenido por 1000 ml:
Tilmicosina (fosfato) 250g. Excipientes c.s.p. 1000ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y aves (engorda y reproductoras).

DOSIS

Administrar en el agua de bebida.
Porcino: 15-20mg de tilmicosina / kg de peso vivo (1.2 - 1.6ml Karitil Oral / 20kg peso vivo), equivalente a 800ml de Karitil Oral por 1000 litros de agua de bebida, durante 5 días.
Aves: 75mg de tilmicosina por litro, equivalente a 300ml de Karitil Oral por 1000 litros de agua de bebida, durante 3 días.
Bovino: 12.5mg de tilmicosina / kg de peso vivo (1ml Karitil Oral / 20kg de peso vivo) por 3 a 5 días en el agua de bebida.

INDICACIONES

Karitil Oral es un antibiótico macrólido que es principalmente bacteriostático, pero en altas concentraciones puede ser un bactericida.
Bovino: Para el tratamiento de la neumonía asociada a *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Actinomyces pyogenes*, *Mycoplasma bovis*.
Porcino: Para el tratamiento de las infecciones respiratorias en porcino, asociadas con *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Actinomyces pyogenes*.
Aves: Para el tratamiento de infecciones respiratorias en aves, asociadas con *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae*, *Ornitobacterium rhinotracheale*, *Pasteurella multocida*.

TIEMPO DE ESPERA

Cerdos:
Carne: 14 días
Bovino:
Carne: 42 días
Aves:
Carne: 12 días.
Huevos: No administrar este producto en aves cuya producción de huevo vaya destinado para consumo humano.

KARITIL PREMIX (MX)

Premezcla medicamentosa para porcino.

Tilmicosina



25 kg 20 kg 10 kg

COMPOSICIÓN
Tilmicosina (fosfato) 200 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
Administración oral en el alimento.
Tratamiento: administrar en el alimento un rango de dosis de 200 a 400g de tilmicosina activa por 1000 kg de alimento durante 10 a 15 días. Preventivo: Administrar en el alimento una dosis de 200g de tilmicosina activa por 1000 kg durante el período de riesgo.

INDICACIONES
Karitil Premix está indicado para el tratamiento y la prevención de la neumonía en porcinos en engorda y crecimiento, causados por *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumonia*e y microorganismos susceptibles a la tilmicosina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 14 días.

LINCO K 11% PREMIX (MX)

Premezcla medicamentosa para porcino.

Lincomicina

25 kg

COMPOSICIÓN
Lincomicina (hidrocloruro) 110 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino (destete, crecimiento y finalización).

DOSIS
Via de administración oral en el alimento balanceado.
Porcino: (destete, crecimiento y finalización):
Preventivo: 44g de lincomicina bas (400g de Linco-K 11% premix) por 1.000 Kg de alimento balanceado compuesto durante tres semanas. La medicación preventiva se recomienda en aquellas explotaciones en donde la enfermedad se encuentre de forma endémica aunque los signos todavía no se hayan presentado. Tratamiento: 110g de lincomicina base (1kg de Linco-K 11% premix) por 1.000 Kg de alimento balanceado compuesto durante tres semanas.

INDICACIONES
Prevención y tratamiento de la disentería porcina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 6 días.

LINCOSOL 400 mg/g (EU)
LINCO-K 400 (MX)

Polvo para administración en agua de bebida.

Lincomicina



COMPOSICIÓN
Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura.

DOSIS
Administrar 5 – 10 mg /Kg p.v./ día durante un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos (equivalente a 12,5 – 25 mg /Kg p.v./día).
Administración en el agua de bebida.

INDICACIONES
Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de *Brachyspira hyodysenteriae* sensibles a la lincomicina.
Aves (pollos de en gorde) Para el control de la enteritis necrótica causada por cepas de *Clostridium perfringens* sensibles a la lincomicina.

TIEMPO DE ESPERA
Porcino (EU): Carne: 0 días
Porcino (MX): Carne: 6 días
Aves (EU): Carne: 0 días
Aves (MX): Carne: 2 días
Huevos: No está permitido su uso en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

TOLTRA-K 25 mg/ml (EU)
KARICOX 2,5% (MX)

Solución para agua de bebida en avicultura y pavos.

Toltrazurilo



COMPOSICIÓN
Toltrazurilo 25 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Pollos y pavos.

DOSIS
Dosis recomendada es de 7 mg/Kg p.v. (equivalente a 28 ml/100 Kg p.v) diariamente durante 2 días consecutivos.

INDICACIONES
Para el tratamiento de coccidiosis en Pollos y Pavos.
Avicultura de carne: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* and *E. tenella*.
Pavos: *Eimeria adenoides*, *E. meleagrimitis*.

TIEMPO DE ESPERA
Pollos (EU): Carne: 18 días.
Huevos: No utilizar en aves que produzcan o que vayan a producir huevos destinados para el consumo humano. No usar en un plazo de 4 semanas anteriores al comienzo del periodo de puesta.
Pollos (MX): Carne: 21 días.
Huevos: No usar en aves de postura después de la 16ª semana de vida.
Pavos (EU): Carne: 16 días.
Pavos (MX): Carne: 21 días.

KARICOX 5% (MX)

Suspensión oral para porcino y bovino.

Toltrazurilo



1 L 250 ml

Bomba dosificadora de 50 ml

COMPOSICIÓN

Toltrazurilo 50 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino y bovino.

DOSIS

Administración vía oral. La suspensión oral debe agitarse antes de su uso.

Porcino: Cada lechón será tratado el día 3-5 de vida con una dosis única de 20mg de toltrazuril/kg de peso vivo (equivalente a 0.4ml de suspensión oral por kg de peso vivo).

Bovino: Cada animal debe tratarse con una dosis única de 15mg de toltrazuril por kg de peso vivo, lo que equivale a 3.0 ml de suspensión oral por 10kg de peso vivo. Para el tratamiento de un grupo de animales de la misma raza y misma edad o similar, la dosis a administrar debe ser acorde a la del animal de mayor peso del grupo.

INDICACIONES

Porcino: Prevención de los signos clínicos de coccidiosis neonatal en cerdos (de 3 a 5 días) en granjas con una historia confirmada de coccidiosis por *Isospora sius*.

Bovino: Para la prevención de los signos clínicos de coccidiosis y reducción de la difusión de coccidios, en terneras de reposición estabuladas en explotaciones lecheras (vacas lecheras), en granjas con historia de coccidiosis causada por *Eimeria bovis* o *Eimeria zuernii*.

TIEMPO DE ESPERA

Porcino:

Carne y vísceras: 77 días.

Bovino:

Carne y vísceras: 63 días.

No debe utilizarse en vacas en lactación cuya leche se destine para consumo humano.

KARIVER 1% (MX)

Solución inyectable para bovino, porcino, ovino y caprino.

Ivermectina

COMPOSICIÓN
Ivermectina 10 mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS
Bovino: vía subcutánea: 1ml por cada 50 kg de peso vivo. (No aplicar vía endovenosa ni intramuscular).
Ovino y Caprino: vía subcutánea: 0.5 ml por cada 25 kg de peso vivo en dosis única.
Porcino: vía subcutánea: 1ml por cada 33 kg de peso vivo en dosis única. Administrar por vía subcutánea en el cuello.

INDICACIONES
Para el tratamiento y control de vermes redondos gastrointestinales y pulmonares, piojos chupadores, y ácaros de la sarna psoróptica y sarcóptica.

TIEMPO DE ESPERA
Bovino, Caprino y Ovino:
Carne: 35 días.
Leche: tiempo no establecido. No suministrar a ganado productor de leche para consumo humano.
Porcino:
Carne: 28 días.

500 ml 250 ml 100 ml

SINCRO K (MX)

Solución inyectable.
Agente luteolítico y sincronizador de celo.

D-Cloprostenol

20 ml

COMPOSICIÓN
D-Cloprostenol 0.075mg/ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y porcino.

DOSIS
Vacas: Administrar la dosis por inyección intramuscular a razón de 2 ml (0.150 mg) por animal. Aplicar en la tabla del cuello o en el cuarto. Cerdas: Administrar la dosis por inyección intramuscular a razón de 1 ml (0.075 mg) por animal. Aplicar en la tabla del cuello.

INDICACIONES
Indicaciones biotécnicas: Sincronización e inducción del celo en vacas y vacas y cerdas. Sincronización del celo estral en donantes y receptoras en programas de transferencia embrionaria. Inducción del parto en cerdas. Indicaciones terapéuticas: Desórdenes funcionales de los ovarios. Celos silenciosos por anestros post-servicio o post-parto. Ciclos irregulares o anovulatorios. Cuerpo lúteo persistente. Cuerpos luteos quísticos. Enfermedades puerperales: endometritis, piometras.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 24 horas
Leche: 4 horas

ISOFLUTEK® 1000 mg/g

Líquido para inhalación del vapor.

Isoflurano

250 ml

COMPOSICIÓN
Isoflurano 1.000 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Equino, perros, gatos, otros.

DOSIS
Vía inhalatoria.
El isoflurano se debe administrar utilizando un vaporizador correctamente calibrado en un circuito anestésico adecuado, puesto que los niveles de anestesia podrían alterarse rápidamente y con facilidad. El isoflurano se puede administrar en oxígeno o mezclas de oxígeno/óxido nitroso. La CAM (concentración alveolar mínima en oxígeno) o los valores de la dosis eficaz DE50 y las concentraciones sugeridas que se indican a continuación para las especies diana se deben usar como guía o punto de partida solamente. Las concentraciones reales necesarias en la práctica dependerán de muchas variables, incluyendo el uso concomitante de otros fármacos durante el procedimiento de anestesia y el estado clínico del paciente. El isoflurano se puede usar junto con otros fármacos de uso común en los tratamientos anestésicos veterinarios para la premedicación, inducción y analgesia. Se dan algunos ejemplos concretos en la información sobre las especies individuales. El uso de la analgesia para procedimientos dolorosos está en conformidad con la buena práctica veterinaria. La recuperación de la anestesia con isoflurano suele ser fácil y rápida. Se deben considerar los requisitos analgésicos del paciente antes de terminar la anestesia general. Aunque el potencial de los anestésicos de dañar la atmósfera es bajo, es una buena práctica usar filtros de carbón con el equipo de depuración en lugar de liberarlos en el aire. VER SPC para una correcta dosificación

INDICACIONES
Inducción y mantenimiento de la anestesia general.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días

OTROS DATOS
Especies de destino: equinos, perros, gatos, aves ornamentales, reptiles, ratas, ratones, hámsters, chinchillas, jerbos, cobayas y hurones.

SEVOTEK® 1000 mg/g

Líquido para la inhalación
del vapor para perros y gatos.

Sevoflurano

COMPOSICIÓN
Sevoflurano 1000 mg/g.

ESPECIES DE DESTINO
Perros, gatos.

DOSIS
Los niveles quirúrgicos de anestesia en el perro sano pueden mantenerse con concentraciones inhaladas del 3,3 al 3,6% en presencia de premedicación. En ausencia de premedicación, las concentraciones inhaladas de sevoflurano del 3,7 al 3,8% proporcionarán niveles quirúrgicos de anestesia en el perro sano. En el gato, la anestesia quirúrgica es mantenida con concentraciones de sevoflurano del 3,7 al 4,5%.
Ver SPC para un mejor uso

INDICACIONES
Para la inducción y mantenimiento de la anestesia.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

250 ml

URISTOP® 40 mg/ml

Jarabe para perros.

Hidrocloruro de fenilpropanolamina

COMPOSICIÓN
Fenilpropanolamina 40,28 mg /ml.
(equivalente a 50 mg / ml de hidrocloruro de fenilpropanolamina)

PRESENTACIÓN
Frasco 50 ml y Frasco de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Perros.

DOSIS
La dosis recomendada es de 1 mg de fenilpropanolamina/kg peso vivo 3 veces al día, en la comida (equivalente a 0,1 ml de medicamento veterinario por cada 5 kg p.v. 3 veces al día).
La absorción del fármaco aumenta cuando se administra a perros en ayunas.

INDICACIONES
Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en la perra. La eficacia se ha demostrado sólo en perras ovario-histerectomizadas.

TIEMPO DE ESPERA
No procede

100ml 50ml

KETOPAIN® 300 mg/ml

Solución para administración en agua de bebida para terneros y porcino.

Ketoprofeno

500 ml 250 ml
Vaso dosificador 30 ml

COMPOSICIÓN
Ketoprofeno 300 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 250 ml y 500 ml con dosificador

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino.

DOSIS
Bovino (terneros)
3 mg/Kg p.v./día, equivalente a 1 ml /100 Kg p.v./día).

INDICACIONES
Tratamiento para la reducción de la pirexia y la disnea asociada con las enfermedades respiratorias en combinación con el tratamiento antiinfeccioso, según sea adecuado.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 1 día.

PRESENTACIONES

SACO
Bolsas de 25 kg de papel de estraza de tres capas con una capa interior de polietileno de baja densidad.



BOTELLA DE POLIETILENO
Alta densidad con tapa de rosca.



BOLSA ALUMINIZADA
Bolsas termoselladas fabricadas de un complejo de poliéster, aluminio y polietileno.





FRASCO
Vial de vidrio, cerrado con un tapón de caucho bromobutilo de 20 mm y sello de aluminio laqueado natural.

FRASCOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Bomba dosificadora de polipropileno/ polietileno/acero inoxidable.
Tapón roscado de polipropileno.



FRASCOS BLANCOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
Con tapón de rosca de polietileno de alta densidad. El envase incluye un vaso dosificador de 30 ml de polipropileno para un ajuste preciso de la dosis.





Para más información sobre los productos listados consultar el prospecto correspondiente.

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com

KARIZOO