

ANTIBIÓTICOS KARIZOO

Marbofloxoral

20 y 80 mg Comprimidos para perros
Marbofloxacin



20 y 80 mg
100 comprimidos



Enrotab

50 y 150 mg Comprimidos para perros
Enrofloxacin



50 y 150 mg
20 comprimidos

Betafuse

1 mg/g + 5 mg/g Gel para perros
Ácido fusídico y Betametasona



Gel tópico



Noroclav

50, 250 y 500 mg Comprimidos para perros y gatos
Amoxicilina y Ácido Clavulánico



50, 250 y 500 mg
Comprimidos



Noroclav

175 mg Suspensión Inyectable
Amoxicilina y Ácido Clavulánico



50 ml inyectable



Marbofloxoral 20 y 80 mg. Comprimidos para perros. Principio activo: Marbofloxacin. Especies de destino: perros. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles al marbofloxacin en Piodermia superficial o profunda, infecciones del tracto urinario asociadas o no a prostatitis y epididimitis e infecciones respiratorias. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en perros de razas grandes de menos de 12 meses de edad. No usar en animales epilépticos ante la ausencia de datos en estos casos. **Posología y vía de administración:** vía oral. 2 mg/kg. **Título de la autorización de la comercialización:** Fatro Iberica S.L., C/ Constitución 1, Planta baja 3 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) Nº registro Marbofloxoral 20 mg: 2724ESP, Marbofloxoral 80 mg: 2725ESP, / Enrotab 50 y 150 mg. **Comprimidos para perros.** Principio activo: Enrofloxacin. Especies de destino: perros. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones de vías urinarias inferiores (asociado o no con prostatitis) e infecciones de vías urinarias superiores causadas por *Escherichia coli* o *Proteus mirabilis*. Tratamiento de piodermia superficial y profunda. **Contraindicaciones:** No usar en cachorros o en perros en crecimiento (perros de menos de 12 meses en razas pequeñas o de menos de 16 meses en razas grandes). No administrar a perros que tengan trastornos renales. No usar en perros en caso de hipersensibilidad conocida a las fluorquinolonas o a algún excipiente del medicamento veterinario. No utilizar en caso de resistencia a las quinolonas, ya que puede existir resistencia cruzada casi completa con otras quinolonas y resistencia cruzada completa con otras fluorquinolonas. No usar junto a tetraciclinas, fenicolos y macrólidos debido a efectos antagonistas potenciales. **Posología y vía de administración:** vía oral, 5mg/kg/día. **Título de la autorización de comercialización:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania 8. Nº registro: 2215ESP y 2216ESP. / **Betafuse 1mg/g + 5 mg/g. Gel para perros.** Principio activo: cada gramo de betafuse contiene 1 mg de Betametasona y 5 mg de ácido fusídico. **Especie de destino:** perros. **Indicaciones:** tratamiento de piodermia de superficie como la dermatitis húmeda aguda (incluidos o puntos calientes) y el intertrigo (dermatitis de los pliegues) causadas por gérmenes sensibles al ácido fusídico. **Contraindicaciones:** no usar en piodermias profundas, no usar en forunculosis piroftrómica con lesiones satélites de pápulas y/o pustulas, no usar en presencia de infección fúngica, viral o demodécica, no aplicar en ojos, no aplicar en áreas extensas. **Periodo de validez:** una vez abierto el envase 8 semanas. **Título de la autorización de comercialización:** Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, County Down Irlanda del Norte. BT35 6JP. Nº autorización de comercialización: 3483 ESP. **Producto de uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. / Noroclav Comprimidos. Principio activo:** Amoxicilina y Ac. Clavulánico 50, 250 y 500 mg. **Especies de destino:** perros y gatos. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones respiratorias, de piel, tracto urinario y tejidos blandos, provocadas por cepas productoras de betalactamasas y sensibles a la combinación Amoxicilina y Ácido Clavulánico. **Posología:** 12,5 mg/kg dos veces al día. No usar en animales hipersensibles a las penicilinas u otros betalactámicos. No usar en conejos, jerbos, cobayas Nº Registro: 1571ESP, 1572ESP, 1801ESP. **Título de la autorización de comercialización:** Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP, Co. Down, Irlanda del Norte. / **Noroclav Inyectable. Principio activo:** Amoxicilina y Ac. Clavulánico 175 mg. **Especies de destino:** perros. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones respiratorias, de piel, tracto urinario y tejidos blandos, provocadas por cepas productoras de betalactamasas y sensibles a la combinación Amoxicilina y Ácido Clavulánico. **Posología:** 6,75 mg/kg una vez al día. No usar en animales hipersensibles a las penicilinas u otros betalactámicos. No usar en conejos, jerbos, cobayas. Utilizar siempre jeringa y aguja seca. Nº Registro: 1562 ESP. **Título de la autorización de comercialización:** Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP, Co. Down, Irlanda del Norte.



KARIZOO

Cepedox® vet

Comprimidos para
perros y gatos
Doxiciclina

PRINCIPIO ACTIVO

Doxiciclina (50, 200 y 400 mg)

ESPECIES DE DESTINO

Perros y gatos.

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la doxiciclina.

Perros: Rinitis provocada por *Bordetella bronchiseptica* y *Pasteurella* spp.; Bronconeumonía provocada por *Bordetella* spp. y *Pasteurella* spp.; Nefritis intersticial provocada por *Leptospira* spp.

Gatos: Infecciones respiratorias provocadas por *Bordetella bronchiseptica*, *Chlamydomphila felis* y *Pasteurella* spp.

POSOLOGÍA

Dosis recomendada 10 mg/día, en una o dos tomas diarias acompañadas de comida. En perros con nefritis intersticial el tiempo de duración del tratamiento ha de ser 14 días y en gatos con C. felis el tratamiento ha de ser durante 30 días

PRESENTACIÓN

Tres concentraciones diferentes. 50, 200 y 400 mg
Los envases contienen 100 comprimidos palatables y divisibles en 2 ó 4 partes.

CONTRAINDICACIONES:

No usar en caso de hipersensibilidad a tetraciclinas o a algún excipiente.

Cepedox vet (50, 200 y 400 mg): Principio activo: Doxiciclina hidrato. **Especies destino:** perros y gatos. **Indicaciones:** infecciones causadas por gérmenes sensibles a Doxiciclina. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a tetraciclinas o algún excipiente. **Dosificación:** 10 mg/kg al día en una ó 2 tomas, siempre acompañado de comida. En perros con nefritis intersticial 15 días, en gatos con C.felis 30 días. **Titular de la comercialización:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania. **Nº registro:** 3920ESP, 3921ESP y 3922ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.**



Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com



KARIZOO