GAMA
PORCINO

KARIZOO

SEDANTES Y ANESTÉSICOS

KETAMIDOR® 100 mg/ml 4
Solución inyectable para bovino, porcino, equino, perros y gatos
Ketamina

PROCAMIDOR® 20 mg/ml 5
Solución inyectable
Procaína

PROCAMIDOR® DUO 40 mg/ml + 0,036 mg/ml 6
Solución inyectable
Procaína y adrenalina

SEDANOL 40 mg/ml 7
Solución inyectable para porcino
Azaperona

ANTIANÉMICO

UNIFERON® 200 mg/ml 8
Solución inyectable para porcino
Hierro dextrano

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

ALAMYCIN® LA 300 10
Solución inyectable antibacteriana
Oxitetraciclina

CITRAMOX® LA 150 mg/ml 11
Suspensión inyectable para bovino y porcino
Amoxicilina

INTERFLOX 100 mg/ml 12
Solución inyectable para bovino, ovino, caprino y porcino
Enrofloxacino

MARVETIN® 100 mg/ml 13
Solución inyectable para bovino y porcino
Marbofloxacino

NIFENCOL® 300 mg/ml 14
Solución inyectable para bovino y porcino
Florfenicol

TULAJECT® 100 mg/ml 15
Solución inyectable para bovino, porcino y ovino
Tulatromicina

ANTIBIÓTICOS ORALES

AMOXICILINA KARIZOO 500 mg/ml 16
Polvo para administración en agua de bebida
Amoxicilina

CITRAMOX® 100 mg/g 17
Polvo para administración en agua de bebida en bovino, porcino y avicultura
Amoxicilina

CITRAMOX® 500 mg/g 18
Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura, pavos y patos
Amoxicilina

CITRAMOX® 1000 mg/g 19
Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura, pavos y patos
Amoxicilina

FLORTEK® 40 mg/ml 20
Premezcla medicamentosa para porcino
Florfenicol

FLORTEK® 100 mg/ml 21
Solución para administración en agua de bebida a porcino
Florfenicol

K-DOX 500 mg/g 22
Polvo para administración en agua de bebida o en leche
Doxiciclina

KARIDOX 100 mg/ml 23
Solución oral para administración en agua de bebida para porcino y avicultura
Doxiciclina

KARIDOX 125 mg/g 24
Premezcla medicamentosa para porcino
Doxiciclina

KARIDOX 500 mg/ml 25
Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura y pavos
Doxiciclina

KARIFLOX 5 mg/ml 26
Solución oral para porcinos
Enrofloxacino

LINCOSOL 400 mg/g 27
Polvo para administración en agua de bebida
Lincomicina

TILMICOSOL 250 mg/ml 28
Concentrado para solución oral para administración en agua de bebida o lactoreemplazante
Tilmicosina

KARIMULINA 125 mg/ml 29
Solución oral para porcino, avicultura y pavos
Tiamulina

KARIMULINA 1000 mg/g 30
Granulado para administración en agua de bebida para porcino, pollos y pavos
Hidrogenofumarato de tiamulina

ZOOTYL® 945000 UI/g 31
Polvo para administración en agua de bebida para porcino, pollos y pavos
Tartrato de tilosina

ANTIESPASMÓDICOS

SPASMIPUR® 20 mg/ml 32
Solución inyectable para bovino, ovino, porcino y equino
Butilbromuro de escopolamina

SPASMIUM® COMPOSITUM 500 mg/ml + 4 mg/ml 33
Solución inyectable para bovino, porcino, equinos y perros
Metamizol y escopolamina

ANTIINFLAMATORIOS

DEXASHOT® 2 mg/ml 34
Solución inyectable para bovinos, porcinos, equinos, perros y gatos
Dexametasona

KETOPAIN® 300 mg/ml 35
Solución para administración en agua de bebida para terneros y porcino
Ketoprofeno

LOXICOM® 20 mg/ml 36
Solución inyectable para bovino, porcino y equino
Meloxicam

RIFEN® 100 mg/ml 37
Solución inyectable para bovino, porcino y equino
Ketoprofeno

RIVALGIN® 500 mg/ml 38
Solucion inyectable
Metamizol

ANTIPARASITARIO INTERNO

CUROFEN 50 mg/g 39
Premezcla medicamentosa para porcino
Fenbendazol

CUROFEN 50 mg/g 40
Polvo oral para porcino
Fenbendazol

NOROMECTIN® 10 mg/ml 41
Solución inyectable para bovino y porcino
Ivermectina

TOLTRAMAX 50 mg/ml 42
Suspensión oral para porcino
Toltrazurilo

HORMONALES

FERTIGEST® 0,004 mg/ml 43
Solución inyectable para bovino, porcino, equino y conejos
Buserelina

INDUPART® 75 µg/ml 44
Solución inyectable para bovino, porcino y equino
D-Cloprostenol

VITAMÍNICOS Y MINERALES

CALMAFUSION 380mg / 60mg / 50mg 45
Solución para perfusión para bovino, ovino y porcino
Gluconato de calcio, cloruro de magnesio y ácido bórico 50 mg

NUTRACÉUTICOS

CITRON 46
Repelente de insectos de uso en animales
Aceites esenciales

GASTRO K GEL 47
Carbón activado para bovino, ovino, caprino, porcino y equino

KARIHIDRA LIQUIDO 48
Solución reconstituyente electrolítos para terneros, corderos, cabritos, lechones y potrillos

LAC-KAR 14 49
Estabilizador hídrico y electrolítico para bovino y porcino

PECTI KAR 14 50
Estabilizador hídrico y electrolítico para bovino y porcino

ULCERPROTEK 51
Emulsión líquida de origen natural

EUTANÁSICO

EXAGON® 400 mg/ml 52
Solución inyectable multiespecie
Pentobarbital

OTROS

VETBUTON® 100 mg/ml 53
Solución inyectable para bovino, ovino, caprino porcino y equinos
Menbutona

TÓPICOS

ALUNIVET AEROSOL 54
Aerosol de aluminio micronizado para bovino, ovino, porcino y equino
Aluminio micronizado

VETERZINC 55
Aerosol de óxido de zinc para bovino, ovino, porcino y equino
Oxido de zinc

KETAMIDOR® 100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino, equino, perros y gatos

Ketamina

FICHA TECNICA

COMPOSICIÓN

Ketamina 100 mg.
(como hidrocloruro).

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 10 ml y 50 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, equino, perros, gatos.

DOSIS

Para la inducción de la anestesia en combinación con azaperona.
Ketamina 15 - 20 mg/Kg p.v. IM
(1,5 - 2 ml/10 Kg) y 2 mg/Kg p.v. azaperona IM.

INDICACIONES

Para la inducción de la anestesia en combinación con azaperona.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días.

PROCAMIDOR® 20 mg/ml

Solución inyectable

Procaína

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Hidrocloruro de procaína 20 mg.
(equivalente a 17,3 mg de procaína).

PRESENTACIÓN

Envase de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, porcino, equino, perros, gatos.

DOSIS

Anestesia por infiltración:
Inyección subcutánea en el área quirúrgica o alrededor: 100 - 400 mg equivalente a 5 - 20 ml.
Anestesia epidural inyección en el espacio epidural:
20 mg equivalente a 1 ml/4,5 Kg p.v. (máximo 400mg, equivalente a 20 ml).
Vía subcutánea, perineural y epidural.

INDICACIONES

Para usar en anestesia por infiltración y anestesia epidural.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días.

PROCAMIDOR® DUO
40 mg/ml + 0,036 mg/ml
Solución inyectable
Procaína y adrenalina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Hidrocloruro de procaína 40 mg.
(equivalente a 34,65 mg de procaína).
Tartrato de adrenalina 0,036 mg.
(equivalente a 0,02 mg de adrenalina)

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equinos.

DOSIS
Anestesia local o por infiltración:
Inyección en la hipodermis o alrededor del área afectada de 100 - 400 mg de hidrocloruro de procaína + 0,09 - 0,36 mg de tartrato de adrenalina/animal equivalente a 2,5 - 10 ml /animal.
Anestesia perineural:
Inyectar cerca de la rama del nervio de 200 - 400 mg de hidrocloruro de procaína + 0,18 - 0,36 mg de tartrato de adrenalina/animal, equivalente a 5 - 10 ml/animal.
Vía subcutánea y perineural.

INDICACIONES
Anestesia local con efecto anestésico durante 1 - 2 horas.
Anestesia por infiltración
Anestesia perineural

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.

SEDANOL 40 mg/ml

Solución inyectable para porcino

Azaperona

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Azaperona 40 mg.

PRESENTACIÓN

Caja de cartón con 1 vial de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino.

DOSIS

Comportamiento agresivo (reagrupación, canibalismo de lechones), obstetricia.
2 mg de azaperona/Kg p.v. (1 ml /20 Kg p.v.).
Estrés:

- Estrés cardiovascular: 0,4 mg de azaperona/ Kg p.v. (0,2 ml /20 Kg p.v.).
- Estrés provocado por el transporte:

Transporte de cochinillos, lechones destetados y cerdos macho.

- 1,0 mg de azaperona/Kg p.v. (0,5 ml /20 Kg p.v.).

Transporte de cerdas y cerdos de engorde.

- 0,4 mg de azaperona/Kg p.v. (0,2 ml /20 Kg p.v.).

Premedicación en la anestesia local y general, distrofia muscular nutricional.

- 1-2 mg de azaperona/ Kg p.v. (0,5-1 ml / 20 Kg p.v.).

Vía Intramuscular detrás de la oreja.

INDICACIONES

Sedante neuroléptico para porcino:
Para uso en animales con comportamiento agresivo

- después del reagrupamiento
- en cerdas (cerdas que muestran canibalismo con sus lechones).

Para uso en animales con estrés y para la prevención del estrés

- estrés cardiovascular
- estrés provocado por el transporte.

Obstetricia.
Como premedicación en la anestesia local o general.
Para el alivio de los síntomas en animales con distrofia muscular nutricional

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 18 días.

ANTIANÉMICO

UNIFERON® 200 mg/ml

Solución inyectable
para porcino
Hierro dextrano

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
200 mg/ml de hierro (III) en forma de complejo de hidróxido de hierro (III) dextrano y 5 mg de fenol como conservante.

PRESENTACIÓN
Envases de 200 ml plástico blanco colapsable.
Caja 5 envases 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino (lechones).

DOSIS
200 mg de hierro (como hierro dextrano por lechón) se corresponden con 1 ml por lechón.
Prevención: una única inyección entre 1 y 4 días de edad.
Vía intramuscular o subcutánea en una única inyección.

INDICACIONES
Tratamiento y prevención de anemias por deficiencias de hierro.

ENFERMEDADES
Anemia ferropenica.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.

ALAMYCIN® LA 300

Solución inyectable antibacteriana

Oxitetraciclina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina 300 mg.
(en forma de oxitetraciclina dihidrato).

PRESENTACIÓN

Envases de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, porcino.

DOSIS

30 mg/Kg p.v.
Vía intramuscular profunda.

INDICACIONES

Está indicado para el control y tratamiento de una amplia gama de infecciones comunes sistémicas, respiratorias, urinarias y locales, causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina.

ENFERMEDADES

Enfermedades como pasteurelosis, neumonía, rinitis atrófica, mal rojo, artritis, onfalitis, y como terapia de apoyo en mastitis. Sindrome MMA en porcinos.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 28 días.

CITRAMOX® LA 150 mg/ml

Suspensión inyectable
para bovino y porcino
Amoxicilina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Amoxicilina 150,00 mg
(equivalente a 172,20 mg de amoxicilina trihidrato)

PRESENTACIÓN
Envases de 100ml y 250ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino.

DOSIS
15 mg de amoxicilina por Kg p.v.;
correspondiente a 1 ml /10 Kg p.v.
La administración debe repetirse una vez después de 48 horas.
(Ver SPC)
Uso intramuscular.

INDICACIONES
Tratamiento de las infecciones respiratorias causadas por microorganismos sensibles a la amoxicilina.

ENFERMEDADES
Infecciones respiratorias causadas por *Pasteurella multocida* sensible a la amoxicilina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 20 días

INTERFLOX 100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino, caprino y porcino

Enrofloxacino

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Enrofloxacino 100 mg.

PRESENTACIÓN
Vial de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS
2,5 mg enrofloxacino /Kg p.v., que corresponde a 0,5ml /20 Kg p.v./día durante 3 días.
Infección del tracto digestivo o septicemia causada por *Escherichia coli*: 5 mg de enrofloxacino, que corresponde a 1ml /20 Kg p.v./día durante 3 días por vía intramuscular en la base del cuello o de la oreja.

INDICACIONES
Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de las infecciones del tracto urinario causadas por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento del síndrome de disgalactía posparto (SDP)/ síndrome de mastitis, metritis y agalactia (MMA) causado por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por cepas de sensibles al enrofloxacino.

ENFERMEDADES
Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma spp.* y *Actinobacillus pleuropneumoniae* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de las infecciones del tracto urinario causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento del síndrome de disgalactía posparto (SDP)/ síndrome de mastitis, metritis y agalactia (MMA) causado por cepas de *Escherichia coli* y *Klebsiella spp.* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 13 días.

MARVETIN® 100 mg/ml

Solución inyectable
para bovino y porcino
Marbofloxacino

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Marbofloxacino 100 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino (cerdas adultas).

DOSIS
2 mg/Kg p.v. (equivalente a 1 ml/50 Kg p.v./día), durante 3 días consecutivos (cerdas adultas).
Vía intramuscular.

INDICACIONES
Tratamiento del Síndrome de Disgalaxia Postparto, (SDP) y Síndrome Metritis Mastitis Agalaxia (MMA), causado por cepas bacterianas sensibles a marbofloxacino

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 4 días.

NIFENCOL® 300 mg/ml

Solución inyectable
para bovino y porcino
Florfenicol

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Florfenicol 300 mg.

PRESENTACIÓN
Envase 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino.

DOSIS
15 mg/Kg p.v. (equivalente 1 ml/20 Kg p.v.) dos veces con intervalo de 48 horas.
Vía intramuscular.

INDICACIONES
Tratamiento de brotes agudos de enfermedad respiratoria sensibles al florfenicol.

ENFERMEDADES
Tratamiento de brotes agudos de enfermedad respiratoria causados por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles al florfenicol.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 18 días.

TULAJECT® 100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino y ovino

Tulatromicina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Tulatromicina 100 mg.

PRESENTACIÓN
Vial de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino y porcino.

DOSIS
Vía intramuscular.
Una única inyección intramuscular de 2,5 mg de tulatromicina/Kg p.v. (equivalente a 1 ml / 40 Kg p.v.) en el cuello.

INDICACIONES
Tratamiento y metafilaxis de enfermedades respiratorias de porcino (ERP). Debe establecerse la presencia de enfermedad en el rebaño antes del uso del medicamento veterinario. El medicamento veterinario solo debe usarse si se espera que los cerdos desarrollen la enfermedad en el plazo de 2-3 días.

ENFERMEDADES
Tratamiento y metafilaxis de enfermedades respiratorias de porcino (ERP) asociadas con *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma hyopneumoniae* *Haemophilus parasuis* y *Bordetella bronchiseptica* sensibles a tulatromicina. Debe establecerse la presencia de enfermedad en el rebaño antes del uso del medicamento veterinario. El medicamento veterinario solo debe usarse si se espera que los cerdos desarrollen la enfermedad en el plazo de 2-3 días.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 13 días.

AMOXICILINA KARIZOO 500 mg/ml

Polvo para administración
en agua de bebida
Amoxicilina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Amoxicilina trihidrato 500 mg.
(equivalente a 435,6 mg de amoxicilina base).

PRESENTACIÓN
Sacos de 400 g y 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos, patos.

DOSIS
20 mg/Kg p.v./día, durante 4 días.
Vía oral, a través del agua de bebida
El agua medicada debe renovarse cada
24 horas.

INDICACIONES
Para el tratamiento de procesos infecciosos causados por cepas sensibles a la Amoxicilina.

ENFERMEDADES
Tratamiento de procesos infecciosos causados por *Streptococcus suis*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 6 días.

CITRAMOX® 100 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida en bovino, porcino y avicultura

Amoxicilina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Amoxicilina 100 mg.
(equivalente a 114,78 mg de amoxicilina trihidrato).

PRESENTACIÓN
Bolsas de 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, avicultura.

DOSIS
10 mg /Kg p.v. cada 12 horas, durante 5 días consecutivos, (1 g /10 Kg p.v./cada 12 horas). Si no se apreciara mejoría las primeras 48 horas reconsiderar el diagnóstico. El agua medicada debe ser la única fuente de agua de bebida durante el periodo de tratamiento.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina.

ENFERMEDADES
Las causadas por colibacilosis, salmonelosis, estreptococias y estafilococias.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 10 días.

CITRAMOX® 500 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura, pavos y patos

Amoxicilina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Amoxicilina 436 mg.
(equivalente a 500 mg de amoxicilina trihidrato).

PRESENTACIÓN
Bolsas de 400 g y 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos, patos.

DOSIS
20 mg/Kg p.v. (equivalente a 40 mg/Kg p.v.) diariamente hasta un máximo de 5 días.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina

ENFERMEDADES
Tratamiento de pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días.

CITRAMOX® 1000 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida para porcino, avicultura, pavos y patos

Amoxicilina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Amoxicilina 871,2 mg.
(equivalente a 1.000 mg de amoxicilina trihidrato).

PRESENTACIÓN
Bolsas de 200 g y 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura, pavos, patos.

DOSIS
20 mg/Kg p.v. (equivalente a 20 mg/Kg p.v./día hasta un máximo de 5 días.
Administrar en el agua de bebida.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la amoxicilina.

ENFERMEDADES
Para el tratamiento de pasteurelosis.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 2 días.

FLORTEK® 40 mg/ml

Premezcla medicamentosa para porcino

Florfenicol

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Florfenicol 40 mg.

PRESENTACIÓN
Sacos de 25 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino (Cerdos de engorde).

DOSIS
10 mg/Kg p.v. (equivalente a 250 mg/g premezcla medicamentosa) por día, administrado durante 5 días consecutivos.

INDICACIONES
Tratamiento y metafilaxis de la enfermedad respiratoria porcina. Debe confirmarse la presencia de la enfermedad en la piara antes del tratamiento metafiláctico.

ENFERMEDADES
Enfermedad respiratoria porcina causada por *Pasteurella multocida* sensible a florfenicol.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 14 días.

FLORTEK® 100 mg/ml

Solución para administración en agua de bebida a porcino

Florfenicol

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Florfenicol 100 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
10 mg/Kg p.v. por día durante 5 días consecutivos.
Administración en agua de bebida

INDICACIONES
Tratamiento y metafilaxis a nivel del grupo donde están presentes los signos clínicos de la enfermedad respiratoria porcina.
La presencia de la enfermedad debe ser establecida en el rebaño antes de iniciar tratamiento metafilactico.

ENFERMEDADES
Enfermedad respiratoria porcina asociada con *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles a florfenicol.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 20 días.

OTROS DATOS
Advertencia: Las soluciones con concentraciones superiores a 1,2 g de florfenicol por litro pueden precipitar.
No usar este producto con agua clorada.

K-DOX 500 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida o en leche

Doxiciclina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Doxiciclina 500 mg /g.
(como hiclato de doxiciclina)

PRESENTACIÓN

Bolsas 200 g y 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros prerrumiantes), porcino (cerdos de engorde) y aves (pollos de engorde).

DOSIS

11,5 mg/Kg p.v./día, equivalente a 23 mg/Kg p.v., durante 5 días consecutivos.
Vía Oral.

INDICACIONES

Tratamiento de procesos infecciosos incluidos dentro del complejo respiratorio porcino, causados por microorganismos sensibles a la doxiciclina.

ENFERMEDADES

Microorganismos sensibles a la doxiciclina tales como *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae*

TIEMPO DE ESPERA

Porcino (cerdos de engorde)
Carne: 2 días.

KARIDOX 100 mg/ml

Solución oral para administración en agua de bebida para porcino y avicultura

Doxiciclina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Doxiciclina 100 mg.
(equivalente a doxiciclina hiclato 116,0 mg).

PRESENTACIÓN

Envases de 1 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino, avicultura.

DOSIS

11.5 mg/Kg p.v./día, equivalente a 0,1 ml/Kg p.v., durante 5 días consecutivos.
Administración por vía oral, en agua de bebida.

INDICACIONES

Prevención de enfermedades del tracto respiratorio sensibles a la doxiciclina.

ENFERMEDADES

Enfermedades del tracto respiratorio causadas por *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibles a la doxiciclina.
Previamente al tratamiento, debe asegurarse la presencia de enfermedad en la piara.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 7 días.

KARIDOX 125 mg/g

Premezcla medicamentosa para porcino

Doxiciclina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Doxiciclina (hiclato) 125,0 mg.
(como hiclato de doxiciclina 144,2 mg).

PRESENTACIÓN

Sacos de 25 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdos de engorde).

DOSIS

10-12 mg /Kg p.v./día, equivalente a una dosis de 80-95 mg /Kg p.v./día. La tasa recomendada de incorporación en pienso sería de 2 Kg por tonelada de pienso.
El tratamiento debe continuarse durante 8 días. Vía oral, en el alimento.

INDICACIONES

Tratamiento y metafilaxis de pleuroneumonía.

ENFERMEDADES

Tratamiento y metafilaxis de pleuroneumonía causada por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* sensibles a la doxiciclina. La presencia de la enfermedad en el ganado debe estar establecida antes de su uso.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 5 días.

KARIDOX 500 mg/ml

Polvo para administración
en agua de bebida para porcino,
avicultura y pavos

Doxiciclina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Doxiciclina 500,0 mg.
(equivalente a Doxiciclina hiclato 580,0 mg).

PRESENTACIÓN

Envases de 200 g y 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdos de engorde), aves (pollos de engorde y reproductores) y pavos (pavos de engorde y reproductores)

DOSIS

23,1 mg/Kg p.v./día (equivalente a 40,0 mg/Kg p.v./día), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas por cepas sensibles a la doxiciclina.

ENFERMEDADES

Tratamiento de *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles a la doxiciclina.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 4 días.

KARIFLOX 5 mg/ml

Solución oral para porcinos

Enrofloxacino

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Enrofloxacino 5,0 mg/ml.

PRESENTACIÓN
Envase de 250 ml con bomba dosificadora de 1 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino (lechones).

DOSIS
5 mg / 3 Kg p.v. /día. equivalente a 1 ml/ 3 Kg p.v. /día, de 3 a 5 días.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones gastrointestinales en lechones (hasta 10 Kg).

ENFERMEDADES
Tratamiento de infecciones producidas por *Escherichia coli*. Para ser utilizado cuando la experiencia clínica y/o las pruebas de sensibilidad indiquen el enrofloxacino como fármaco de elección.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 10 días.

LINCOSOL 400 mg/g

Polvo para administración en agua de bebida

Lincomicina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg.

PRESENTACIÓN
Bolsas de 100 g y 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura.

DOSIS
Administrar 5 - 10 mg /Kg p.v./ día durante un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos (equivalente a 12,5 - 25 mg /Kg p.v./día).
Administración en el agua de bebida.

INDICACIONES
Para el tratamiento de la disentería porcina causada por cepas sensibles a la lincomicina

ENFERMEDADES
Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de *Brachyspira hyodysenteriae* sensibles a la lincomicina.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.

TILMICOSOL 250 mg/ml

Concentrado para solución oral
para administración en agua de bebida
o lactoreemplazante

Tilmicosina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Tilmicosina (como fosfato) 250 mg.

PRESENTACIÓN
Envase de 1 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino (terneros pre-rumiantes), porcino (cerdos), aves (pollos exceptuando gallinas que produzcan huevos para consumo humano) y pavos.

DOSIS
Dosis diaria de 15-20 mg/Kg p.v. durante 5 días, que corresponden a 200 mg de tilmicosina por litro (80 ml de Tilmicosol por 100 litros).
Añadir al agua de bebida.

INDICACIONES
Para el tratamiento y metafilaxis de infecciones respiratorias.

ENFERMEDADES
Tratamiento y metafilaxis de *Mycoplasma hyopneumoniae*, *Pasteurella multocida* y *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 14 días.

KARIMULINA 125 mg/ml

Solución oral para porcino, avicultura y pavos

Tiamulina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Hidrógenofumarato de tiamulina 125,0 mg (equivalente a tiamulina base 101,2 mg).

PRESENTACIÓN

Envase de 1 L.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino, avicultura (pollos de engorde, pollos de reposición, pollos reproductores y gallinas ponedoras) y pavos (pavos de engorde y pavos reproductores).

DOSIS

Tratamiento de la disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*.
Dosis: 8,8 mg / Kg p.v./día equivalente a 0,07 ml / Kg p.v./día), durante 3-5 días consecutivos dependiendo de la severidad de la infección y/o de la duración de la enfermedad:
Tratamiento de la neumonía enzoótica causada por *M. hyopneumoniae*.
Dosis: 15,0-20,0 mg/ Kg p.v./día equivalente a 0,12-0,16 ml / Kg p.v./día durante 5-10 días consecutivos.
Tratamiento de la pleuroneumonía causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*.
Dosis: 20 mg/ Kg p.v./día (equivalente a 0,16 ml/ Kg p.v./día durante 5 días consecutivos

INDICACIONES

Para el tratamiento de la disentería porcina, de la pleuroneumonía y de la neumonía enzoótica sensibles a la Tiamulina.

ENFERMEDADES

Tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de *Brachyspira hyodysenteriae* sensibles a la Tiamulina, de la pleuroneumonía causada por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* sensibles a la Tiamulina y de la neumonía enzoótica causada por cepas de M. *hyopneumoniae* sensibles a la Tiamulina.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 4 días.

KARIMULINA 1000 mg/g

Granulado para administración en agua de bebida para porcino, pollos y pavos

Hidrogenofumarato de tiamulina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Hidrogenofumarato de tiamulina 1000 mg (equivalente a 809,4 mg de tiamulina base).

PRESENTACIÓN

Caja de cartón plegable de 125 g.
Caja de cartón plegable de 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino.

DOSIS

Tratamiento de la disentería porcina y de la Espiroquetosis Colónica Porcina (colitis): 8,8 mg Karimulina 1000 / Kg p.v. durante 3 a 5 días consecutivos.
Tratamiento de la Enteropatía Proliferativa Porcina (ileitis): 8,8 mg de Karimulina 1000 / Kg p.v. durante 5 días consecutivos.
Tratamiento y metafilaxis de la Neumonía enzoótica: 20 mg de Karimulina 1000 / Kg p.v. durante 5 días consecutivos.
Tratamiento de la pleuropneumonia: 20 mg de Karimulina 1000 / Kg p.v. durante 5 días consecutivos.

INDICACIONES

i) Tratamiento de la disentería porcina sensible a la tiamulina. La presencia de la enfermedad en la granja debe establecerse antes de utilizarse el medicamento veterinario.
ii) Tratamiento de la Espiroquetosis Colónica Porcina (colitis) sensible a la tiamulina. La presencia de la enfermedad en la granja debe establecerse antes de utilizarse el medicamento veterinario.
iii)Tratamiento de la Enteropatía Proliferativa Porcina (ileitis) sensible a la tiamulina. La presencia de la enfermedad en la granja debe establecerse antes de utilizarse el medicamento veterinario.
iv) Tratamiento y metafilaxis de la Neumonía Enzoótica sensible a la tiamulina. La presencia de la enfermedad en la granja debe establecerse antes de utilizarse el medicamento veterinario.
v) Tratamiento de la Pleuroneumonía sensible a la tiamulina. La presencia de la enfermedad en la granja debe establecerse antes de utilizarse el medicamento veterinario.

ENFERMEDADES

i) Tratamiento de la disentería porcina causada por Brachyspira hyodysenteriae.
ii) Tratamiento de la Espiroquetosis Colónica Porcina (colitis) causada por Brachyspira pilosicoli.
iii)Tratamiento de la Enteropatía Proliferativa Porcina (ileitis) causada por Lawsonia intracellularis.
iv) Tratamiento y metafilaxis de la Neumonía Enzoótica causada por Mycoplasma hyopneumoniae incluyendo infecciones complicadas por Pasteurella multocida.
v) Tratamiento de la Pleuroneumonía causada por Actinobacillus pleuropneumoniae.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 2 días (dosis de 8,8 mg de hidrogenofumarato de tiamulina / kg peso vivo)
Carne: 4 días (dosis de 20 mg de hidrogenofumarato de tiamulina / kg de peso vivo).

ZOOTYL® 945000 UI/g

Polvo para administración en agua de bebida para porcino, pollos y pavos.

Tartrato de tilosina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Tartrato de tilosina 945000 UI.

PRESENTACIÓN
Bolsa de 1 kg (contiene 945 MUI).

ESPECIES DE DESTINO
Porcino, avicultura (pollos de engorde, gallinas ponedoras) y pavos.

DOSIS
Tratamiento y prevención de la ileítis:
4380 - 8760 UI/Kg p.v./día (correspondiente a 5 - 10 mg /Kg p.v.) durante 7 días.
Administración en agua de bebida.

INDICACIONES
Tratamiento de la enteropatía proliferativa porcina o ileítis. Deberá determinarse la presencia de la enfermedad en la piara antes de iniciar tratamiento preventivo.

ENFERMEDADES
Tratamiento de la enteropatía proliferativa porcina o ileítis asociada a *Lawsonia intracellularis*. Deberá determinarse la presencia de la enfermedad en la piara antes de iniciar tratamiento preventivo.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.

SPASMIPUR® 20 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino, porcino y equino

Butilbromuro de escopolamina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Butilbromuro de escopolamina 20 mg. (equivalente a 13,8 mg de escopolamina).

PRESENTACIÓN

Envases de 50 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS

0,2 - 0,4 mg /Kg p.v.
(equivalentes a 0,1 - 0,2 ml /10 Kg p.v.).
Vía intravenosa.

INDICACIONES

Tratamiento de espasmos agudos del tracto gastrointestinal (cólico) y urinario. Como ayuda en procedimientos en los que se requiere una menor actividad peristáltica del tracto gastrointestinal o una disminución de las contracciones en el tracto urinario.

ENFERMEDADES

Cólico gastrointestinal y/o urinario.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 9 días.



SPASMIUM® COMPOSITUM 500 mg/ml + 4 mg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino, equinos y perros

Metamizol y escopolamina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Metamizol sódico monohidrato 500,0 mg (equivalente a 443 mg de metamizol) y Butilbromuro de escopolamina 4,0 mg (equivalente a 2,76 mg de escopolamina).

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml, 5 x 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino, perros.

DOSIS
50 mg de metamizol sódico monohidrato/Kg p.v. y 0,4 mg de butilbromuro de escopolamina/Kg p.v. (equivalente a 1 ml/10 Kg p.v.) Inyección única.
Vía intramuscular.

INDICACIONES
Tratamiento de espasmos o aumento del tono sostenido de los músculos lisos del tracto gastrointestinal o de los órganos excretores de la orina y la bilis asociado con dolor.

ENFERMEDADES
Como terapia de apoyo para la diarrea aguda.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 15 días

DEXASHOT® 2 mg/ml

Solución inyectable para bovinos, porcinos, equinos, perros y gatos

Dexametasona

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Dexametasona 2 mg como dexametasona fosfato sódico 2,63 mg.

PRESENTACIÓN

Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, equino, perros, gatos.

DOSIS

0,06 mg/Kg p.v. (1,5 ml/50 Kg p.v.).
Vía intramuscular.

INDICACIONES

Tratamiento de la inflamación y reacciones alérgicas.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 2 días.

KETOPAIN® 300 mg/ml

Solución para administración en agua de bebida para terneros y porcino

Ketoprofeno

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Ketoprofeno 300 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 500 ml con dosificador.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino (terneros) y porcino (cerdos de engorde).

DOSIS
1,5 - 3 mg/Kg p.v./día, equivalente a 0,5 - 1 ml/ 100/Kg p.v./día.
La dosis de 1,5 mg/Kg p.v. es efectiva en el tratamiento de los procesos leves a moderados (temperatura corporal < 41 ºC).
La dosis debe incrementarse hasta 3 mg/Kg p.v para tratar casos más graves.
El tratamiento debe administrarse durante un día. Puede continuarse durante 1-2 días adicionales después de la evaluación beneficio / riesgo efectuada por el veterinario responsable.

INDICACIONES
Tratamiento para la reducción de la pirexia y la disnea asociada con las enfermedades respiratorias en combinación con el tratamiento antiinfeccioso, según sea adecuado

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 1 día.

LOXICOM® 20 mg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino y equino

Meloxicam

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Meloxicam 20 mg.

PRESENTACIÓN

Envases de 50 ml, 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, equino.

DOSIS

Dosis de 0,4 mg/Kg p.v. (equivalente a 2,0 ml/100 Kg p.v.) en asociación con terapia antibiótica, según se considere adecuado. En caso necesario, se puede administrar una segunda dosis de meloxicam después de 24 horas. El volumen máximo que se recomienda administrar en un sitio de inyección es de 2 ml. Inyección única intramuscular.

INDICACIONES

En trastornos no infecciosos del aparato locomotor para reducir los síntomas de cojera e inflamación. Como terapia auxiliar en el tratamiento de la septicemia y la toxemia puerperal (síndrome mastitismetritis-agalactia) con terapia antibiótica adecuada.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 5 días

RIFEN® 100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino y equino

Ketoprofeno

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Ketoprofeno 100 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino.

DOSIS
3 mg/Kg p.v./día hasta 3 días consecutivos, es decir 3 ml/100 Kg p.v./día (= 0,03 ml/Kg p.v.). Vía iintramuscular profunda unica.

INDICACIONES
Enfermedades asociadas con inflamación, dolor o fiebre.

ENFERMEDADES
- Tratamiento asociado con el Síndrome de Disgalactia Posparto/Síndrome de Mastitis Metritis Agalaxia (MMA).
- Infecciones del tracto respiratorio.
- Tratamiento sintomático de la fiebre.

El ketoprofeno también está indicado para la inflamación post-quirúrgica, la terapia sintomática de cólicos y la fiebre.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: IM - 4 días.

RIVALGIN® 500 mg/ml

Solución inyectable

Metamizol

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Metamizol sódico monohidrato 500 mg. (equivalente a metamizol 443,1 mg).

PRESENTACIÓN

Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino, equino, perros.

DOSIS

15-50 mg/Kg p.v. (3-10 ml/100 Kg p.v).
Vía intravenosa lenta (en estados agudos) o vía intramuscular profunda.

INDICACIONES

Enfermedades en las que se puede esperar un efecto positivo de los efectos analgésicos centrales, espasmolíticos, antipiréticos o antiinflamatorios leves del medicamento veterinario

ENFERMEDADES

Alivio general del dolor para reducir el nerviosismo y las reacciones de defensa causadas por el dolor.
Oclusión del esófago con cuerpos extraños.
Enfermedades febriles, como mastitis grave, síndrome de mastitis, metritis y agalactia, gripe porcina.
Lumbalgia, tétanos (en combinación con antisuero contra el tétanos).
Artritis aguda y crónica, estados reumáticos de los músculos y las articulaciones, inflamación de los nervios, neuralgia, tendovaginitis.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 12 días.

CUROFEN 50 mg/g

Premezcla medicamentosa para porcino

Fenbendazol

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Fenbendazol 50 mg.

PRESENTACIÓN

Saco de 25 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino.

DOSIS

Dosis única terapéutica recomendada es de 5 mg/Kg p.v.
Dosis para administrarla a lo largo de 3 o 7 días, es decir, 1,7 mg/Kg p.v./día durante 3 días o 0,7 mg/Kg p.v./día durante 7 días.

INDICACIONES

Para el tratamiento de las formas maduras e inmaduras (L4) sensibles al benzimidazol de los nematodos del tracto gastrointestinal y las vías respiratorias del porcino.

ENFERMEDADES

Hyostrongylus rubidus (gusano rojo del estómago).
Oesophagostomum spp. (gusano nodular).
Ascaris suum (ascárido del cerdo).
Trichuris suis (gusano látigo).
Metastrongylus apri (gusano pulmonar).

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 6 días.

CUROFEN 50 mg/g

Polvo oral para porcino

Fenbendazol

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Fenbendazol 50 mg.

PRESENTACIÓN
Bolsa de 1 Kg y caja con 5 bolsas de 200 g.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino.

DOSIS
Tratamiento individual - dosis única
La dosis terapéutica recomendada es de 5 mg de fenbendazol por Kg p.v. en tratamiento individual de dosis única, lo que equivale a 1 g / 10 Kg p.v., a 5 g/ 50 Kg p.v., o a 20 g / 200 Kg p.v.

INDICACIONES
Para el tratamiento de las formas maduras e inmaduras (L4) sensibles al benzimidazol de los nematodos que infestan el tracto gastrointestinal y las vías respiratorias del cerdo.

ENFERMEDADES
Para el tratamiento de las formas maduras e inmaduras (L4) sensibles al benzimidazol de los siguientes nematodos que infestan el tracto gastrointestinal y las vías respiratorias del cerdo: *Hyostrongylu srubidus* (gusano rojo del estómago), *Oesophagostomum spp.* (gusano nodular), *Ascaris suum* (ascárido del cerdo), *Trichuris suis* (gusano látigo) y *Metastrongylus apri* (gusano pulmonar).

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 6 días.

NOROMECTIN® 10 mg/ml

Solución inyectable
para bovino y porcino
Ivermectina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Ivermectina 10 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 50 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino.

DOSIS
Dosis de 300 µg/Kg p.v.
(equivalente a 1 ml/33 Kg p.v.).
Via subcutánea en el cuello.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por los siguientes parásitos: Vermes redondos gastrointestinales, Vermes pulmonares, Piojos y Ácaros de la sarna.

ENFERMEDADES
Vermes redondos gastrointestinales: *Ascaris suum* (adultos y cuarto estadio larvario) *Hyostrongylus rubidus* (adultos y cuarto estadio larvario) *Oesophagostomum spp.* (adultos y cuarto estadio larvario) *Strongyloides ransomi* (adultos).
Vermes pulmonares: *Metastrongylus spp* (adultos).
Piojos: *Haematopinus suis*.
Ácaros de la sarna: *Sarcoptes scabiei var sui*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 18 días.

TOLTRAMAX 50 mg/ml

Suspensión oral
para porcino
Toltrazurilo

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Toltrazurilo 50 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 250 ml y 1 L.

ESPECIES DE DESTINO
Porcino (Lechones de 3 a 5 días de edad).

DOSIS
Cada lechón debe ser tratado a los 3-5 días de vida con una dosis única oral de 20 mg/Kg p.v., equivalente a 0,4 ml/Kg p.v.
Vía oral.

INDICACIONES
Para la prevención de los signos clínicos de la coccidiosis en lechones neonatales (de 3 a 5 días de edad) en granjas con una historia confirmada de coccidiosis.

ENFERMEDADES
Coccidiosis causada por *Isospora suis*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 77 días.

FERTIGEST® 0,004 mg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino, equino y conejos

Buserelina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Buserelina 0,004 mg.
(equivalente a 0,0042 mg de acetato de buserelina).

PRESENTACIÓN

Vial de 20 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas), porcino (cerdas adultas y cerdas nulíparas) equinos (yeguas) y conejos (conejas reproductoras)

DOSIS

Inseminación artificial para cerdos es el siguiente:
Cerdas nulíparas: 2,5 ml/animal a las 115- 120 horas del final del tratamiento de sincronización con un progestágeno.
Debe hacerse una única inseminación artificial 30-33 horas después de la administración del medicamento.
Cerdas adultas: 2,5 ml/animal a las 83-89 horas tras el destete. o debe hacerse una única inseminación artificial 30-33 horas después de la administración del medicamento.
Vía intramuscular.

INDICACIONES

Inducción de la ovulación tras la sincronización del celo mediante destete (adultas) o mediante la administración de un progestágeno (nulíparas) utilizado como parte de un programa a tiempo único fijado de inseminación artificial.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días.

INDUPART® 75 µg/ml

Solución inyectable para bovino, porcino y equino

D-Cloprostenol

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

D-Cloprostenol 75 µg.
(como D-cloprostenol sódico).

PRESENTACIÓN

Cajas con un vial de 20 ml o de 5 viales de 20 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas), porcino (cerdas adultas) y equinos (yeguas).

DOSIS

Cerdas adultas: 75 µg/animal, equivalente a 1 ml/animal, no antes del día 114 de gestación. Repetir a las 6 horas. De forma alternativa, a las 20 horas de la primera dosis, se puede administrar un estimulante del miometrio (oxitocina o carazolol). Siguiendo el protocolo de la doble administración, aproximadamente el 70-80% de los animales nacerán durante las 20-30 horas posteriores a la primera administración.
Vía intramuscular.

INDICACIONES

Inducción del parto.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 1 día.

CALMAFUSION 380mg / 60mg / 50mg

Solución para perfusión
para bovino, ovino y porcino

Gluconato de calcio, Cloruro de magnesio y Ácido bórico 50 mg

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Gluconato de calcio para soluciones inyectables 380 mg (equivalente a 34,0 mg o 0,85 mmol de Ca^{2+}) Cloruro de magnesio hexahidratado 60 mg (equivalente a 7,2 mg o 0,30 mmol de Mg^{2+}) Ácido bórico 50 mg.

PRESENTACIÓN

Envases de 500ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, porcino.

DOSIS

Administrar 10 - 14 mg Ca^{2+} (0,26 - 0,34 mmol Ca^{2+}) y 2,2 - 2,9 mg Mg^{2+} (0,09 - 0,12 mmol Mg^{2+}) por Kg p.v. correspondiente a 0,3 - 0,4 ml del medicamento veterinario por 1 Kg p.v. Para infusiones intravenosas lentas, se recomienda administración durante un periodo de 20 - 30 minutos. Los volúmenes más pequeños (menos de 50 ml) deben administrarse mediante una jeringa estéril o una bomba de infusión de jeringa.

INDICACIONES

Para el tratamiento de la hipocalcemia aguda complicada por una deficiencia de magnesio.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.

CITRON

Repelente de insectos
de uso en animales
Aceites esenciales

COMPOSICIÓN
Aceites esenciales de Eucalyptus, Citriodora y Geraniol.

PRESENTACIÓN
Envase de 1 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino, equino.

DOSIS
8 - 10 ml (intensivo)
15 ml (extensivo)

INDICACIONES
Citron es un insecticida natural

ENFERMEDADES
Repelente de garrapatas, ácaros, piojos y de insectos voladores (moscas y mosquitos). Control de *Lucilia sericata*, *Wohlfahrtia magnifica*, *Damalia bovis* y *Linognatus vituli*.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

GASTRO K GEL

Carbón activado para bovino, ovino, caprino, porcino y equino

COMPOSICIÓN

Carbón vegetal de roble, glicerina, hojas secas molturadas, cloruro sódico, cloruro potásico.

PRESENTACIÓN

Cartucho de 285 ml -20 unidades.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino, equino.

DOSIS

Cerdas: 30 ml, (2 pulsaciones) al día durante 2 días, si fuera necesario.
Cerdos en cebo: 15 ml (1 pulsación) al día durante 2 días, si fuera necesario.
Lechones: 7,5 ml (media pulsación) al día durante 2 días, si fuera necesario.
Uso oral. Utilizar el cartucho con una pistola adecuada.
Sujetar con delicadeza la cabeza del animal, poner la apertura del cartucho dentro de la boca, y luego presionar.
Cada pulsación suministra 15 ml.

INDICACIONES

Mejora la salud intestinal.
Previene y disminuye la diarrea.
Protege las mucosas intestinales.
Favorece la captación de nutrientes.

ENFERMEDADES

Diarreas inespecificas.
Diarreas mecánicas.
Intoxicaciones alimentarias

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

KARIHIDRA LIQUIDO

Solución reconstituyente electrolítos para terneros, corderos, cabritos, lechones y potrillos

COMPOSICIÓN
Dextrosa, cloruro sódico y fosfato monocálcico.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS
Lechones al destete con diarrea:
de 0,5 a 1 litro de dilución por lechón por día con una concentración de 75 ml de Karihidra Liquido/litro de agua.

INDICACIONES
Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico.

ENFERMEDADES
Diarrea y deshidratación.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

LAC-KAR 14

Estabilizador hídrico y electrolítico
para bovino y porcino

COMPOSICIÓN

Azúcares, fosfato monopotásico, cloruro sódico y *enterococcus faecium*.

PRESENTACIÓN

Caja de 10 sobres x 100 g.
Bolsa con 1 Kg y cubo de 4 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros) y porcino (lechones).

DOSIS

Cerdos: de 2,5 a 5 g /animal/ día durante 5-7 días, mezclado en el pienso.

INDICACIONES

Prevención y tratamiento de trastornos (diarrea) y su convalecencia.
Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico.

ENFERMEDADES

Diarrea y deshidratación.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

PECTI KAR 14

Estabilizador hídrico y electrolítico para bovino y porcino

COMPOSICIÓN

Manzana, algarroba, zanahoria, habas, levadura de cerveza desecada, sal, bicarbonato sódico y fosfato bicálcico.

PRESENTACIÓN

Envases de 10 x 100 g y 3 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros) y porcino (lechones).

DOSIS

Lechones: 50-100 g/animal /día.
1 a 7 días (1 a 3 días si constituye el alimento exclusivo).
Oral, en leche, en agua de bebida o en pienso.

INDICACIONES

Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico.
Prevención y tratamiento de trastornos diarreicos y en su convalecencia.

ENFERMEDADES

Diarrea y deshidratación.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

ULCERPROTEK

Emulsión líquida de origen natural

COMPOSICIÓN

Aceites esenciales de áloe vera y ácido glutámico.

PRESENTACIÓN

Cubos de 4 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino, equino.

DOSIS

1g / 10 Kg p.v. durante 7-9 días.

INDICACIONES

Astringente manteniendo la ulcera limpia.
Genera una cobertura resistente.
Estimula la regeneración celular.
Cicatrizante

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

EXAGON® 400 mg/ml

Solución inyectable
multiespecie
Pentobarbital

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Pentobarbital sódico 400,0 mg.
(equivalente a 364,6 mg de pentobarbital).

PRESENTACIÓN
Envase de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, porcino, equino, avicultura, pavos, patos, cunicultura, perros, gatos, otros.

DOSIS
Vena cava craneal:
Vía intravenosa como bolo rápido:
0,1 ml/Kg p.v. animales que pesan > 30 Kg.
0,2 ml/Kg p.v. en animales que pesan < 30 Kg.
Vena marginal de la oreja:
Vía intravenosa como bolo rápido:
0,1 ml/Kg p.v. en animales que pesan > 30 Kg.
0,2 ml/Kg p.v en animales que pesan < 30 Kg.
Vía intracardiaca:
0,1 ml/Kg p.v. en animales que pesan > 30 Kg.
0,2 ml/Kg p.v. en animales que pesan < 30 Kg.

INDICACIONES
Eutanasia

TIEMPO DE ESPERA
No usar en animales destinados al consumo humano o animal.
Se tomarán las medidas adecuadas para garantizar que los cuerpos de los animales muertos tratados con este medicamento veterinario y los subproductos de estos animales no entren en la cadena alimentaria y no se utilicen para el consumo humano o animal.

VETBUTON® 100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino, caprino porcino y equinos

Menbutona

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Menbutona 100,00 mg.

PRESENTACIÓN

1 vial de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino, equino.

DOSIS

Inyección intramuscular o intravenosa.
10 mg de menbutona por Kg p.v
por vía IM profunda o IV lenta, equivalente a 1 ml /10 Kg p.v.

INDICACIONES

Estimulación de la actividad hepatodigestiva en caso de trastornos digestivos e insuficiencia hepática.
Indigestiones.
Cólicos.
Estreñimiento.
Anorexia.
Toxemias.
Intoxicaciones.
Cetosis.
Insuficiencias hepática y pancreática.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días.
Leche: 0 días

ALUNIVET AEROSOL

Aerosol de aluminio micronizado para bovino, ovino, porcino y equino

Aluminio micronizado

COMPOSICIÓN
Aluminio micronizado.

PRESENTACIÓN
Envase de 200 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS
Aplicar sobre la piel limpia y seca a una distancia de 10 a 20 cm.

INDICACIONES
Crea un escudo de protección y estimula la rápida recuperación de los defectos en la piel, como cortes y escoriaciones. Protege la zona dañada como un vendaje.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

VETERZINC

Aerosol de óxido de zinc para bovino, ovino, porcino y equino

Oxido de zinc

COMPOSICIÓN
Oxido de zinc.

PRESENTACIÓN
Envase de 200 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino, equino.

DOSIS
Aplicar sobre la piel limpia y seca a una distancia de 10 a 20 cm del área a cubrir.

INDICACIONES
Funciona como un vendaje de pomada, mantiene la piel elástica y tiene un efecto protector excelente. Se puede utilizar como revestimiento protector.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

Para más información sobre los productos listados consultar el prospecto.

PUBLI00067 01/2022

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com

KARIZOO