GAMA
OVINO

ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.

ANESTÉSICOS

PROCAMIDOR® 20 mg/ml 4
Solución inyectable
Procaína

PROCAMIDOR® DUO 40 mg/ml + 0,036 mg/ml 5
Solución inyectable
Procaína y adrenalina

ANTIBIÓTICOS INYECTABLES

ALAMYCIN® LA 300 6
Solución inyectable antibacteriana
Oxitetraciclina

INTERFLOX 100 mg/ml 7
Solución inyectable para bovino, ovino, caprino y porcino
Enrofloxacino

TILMIPRIL 300 mg/ml 8
Solución inyectable para bovino y ovino
Tilmicosina

TULAJECT® 100 mg/ml 9
Solución inyectable para bovino, ovino y porcino
Tulatromicina

ANTIBIÓTICOS TÓPICOS

ALAMYCIN® AEROSOL 10
Aerosol tópico antibacteriano para bovino y ovino
Oxitetraciclina

ANTIESPASMÓDICOS

SPASMIPUR® 20 mg/ml 12
Solución inyectable para bovino, ovino, porcino y equino
Butilbromuro de escopolamina

ANTIPARASITARIOS

CLOSAMECTIN® 5 mg/ml – 125 mg/ml 13
Solución inyectable para bovino y ovino
Ivermectina y closantel

NOROMECTIN® 10 mg/ml 14
Solución inyectable para ovino
Ivermectina

NOROMECTIN® DRENCH 0,8 mg/ml 15
Solución oral para ovino
Ivermectina

SPOTINOR® 10 mg/ml 16
Solución spot-on para bovino y ovino
Deltametrina

VITAMÍNICOS Y MINERALES

CALMAFUSION 380mg / 60mg / 50mg 17
Solución para perfusión para bovino, ovino y porcino
Gluconato de calcio, cloruro de magnesio y ácido bórico 50 mg

NUTRACÉUTICOS

CITRON 18
Repelente de insectos de uso en animales
Aceites esenciales

KARIDIET PRO 19
Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico para apoyar la digestión fisiológica
Plantago ovata

GASTRO K GEL 20
Carbón activado para bovino, ovino, caprino, porcino y equino

KARIHIDRA LIQUIDO 21
Estabilizador hídrico y electrolítico para terneros, corderos, cabritos, lechones y potrillos

K-LOSTRUM 22
Suplemento del calostro para terneros, corderos y cabritos

ULCERPROTEK 23
Emulsión líquida de origen natural

TÓPICOS

ALUNIVET AEROSOL 24
Aerosol de aluminio micronizado para bovino, ovino, porcino y equino
Aluminio micronizado

VETERZINC 25
Aerosol de óxido de zinc para bovino, ovino, porcino y equino
Oxido de zinc

OTROS

VETBUTON 100 mg/ml 26
Solución inyectable para bovino, ovino, caprino, porcino y equinos
Menbutona

PROCAMIDOR® 20 mg/ml

Solución inyectable

Procaína

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Hidrocloruro de procaína 20 mg.
(equivalente a 17,3 mg de procaína).

PRESENTACIÓN

Envase de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, porcino, equino, perros y gatos.

DOSIS

Anestesia por infiltración:
Inyección subcutánea en el área quirúrgica o alrededor 5 - 20 ml (equivalente a 100 - 400 mg).
Anestesia epidural sacra o posterior:
3 - 5 ml (equivalente a 60 - 100 mg).
Anestesia epidural anterior:
Máximo 15 ml (equivalente a 300 mg)
Vía subcutánea, perineural y epidural.

INDICACIONES

Para usar en:
Anestesia por infiltración bovino, ovino, porcino, equino, perros y gatos.
Anestesia epidural en bovino, ovino, porcino y perros.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.

PROCAMIDOR® DUO
40 mg/ml + 0,036 mg/ml
Solución inyectable
Procaína y adrenalina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Hidrocloruro de procaína 40 mg.
(equivalente a 34,65 mg de procaína).
Tartrato de adrenalina 0,036 mg.
(equivalente a 0,02 mg de adrenalina).

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
Anestesia local o por infiltración:
Inyección en la hipodermis o alrededor del área afectada de 100 - 400 mg de hidrocloruro de procaína + 0,09 - 0,36 mg de tartrato de adrenalina/animal equivalente a 2,5 - 10 ml / animal.
Anestesia perineural:
Inyectar cerca de la rama del nervio de 200 - 400 mg de hidrocloruro de procaína + 0,18 - 0,36 mg de tartrato de adrenalina/ animal, equivalente a 5 - 10 ml/animal.
Vía subcutánea y perineural.

INDICACIONES
Anestesia local con efecto anestésico durante 1 - 2 horas.
Anestesia por infiltración.
Anestesia perineural.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.

ALAMYCIN® LA 300

Solución inyectable antibacteriana

Oxitetraciclina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina
(en forma de oxitetraciclina dihidrato) 300 mg.

PRESENTACIÓN

Envases de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

DOSIS

30 mg/Kg p.v.
Vía intramuscular profunda.

INDICACIONES

Está indicado para el control y tratamiento de una amplia gama de infecciones comunes sistémicas, respiratorias, urinarias y locales, causadas por microorganismos sensibles a la oxitetraciclina.

ENFERMEDADES

Enfermedades como pasteurelosis, neumonía, rinitis atrófica, mal rojo, artritis, onfalitis, y como terapia de apoyo en mastitis.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 35 días.
Leche: 9 días.

INTERFLOX 100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino, caprino y porcino

Enrofloxacino

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Enrofloxacino 100 mg.

PRESENTACIÓN
Vial de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino y porcino.

DOSIS
Administración subcutánea.
5 mg enrofloxacino /Kg p.v., que corresponde a 1ml /20 Kg p.v./día durante 3 días.

INDICACIONES
Ovino: Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la mastitis causada por cepas sensibles al enrofloxacino.
Caprino: Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por cepas sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la mastitis causada por cepas sensibles al enrofloxacino.

ENFERMEDADES
Ovino:
Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la mastitis causada por cepas de *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.
Caprino:
Tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida* y *Mannheimia haemolytica* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.
Tratamiento de la mastitis causada por cepas de *Staphylococcus aureus* y *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacino.

TIEMPO DE ESPERA
Ovino:
Carne: 4 días.
Leche: 3 días.
Caprino:
Carne: 6 días.
Leche: 4 días.

TILMIPRIL 300 mg/ml

Solución inyectable para bovino y ovino

Tilmicosina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Tilmicosina 300 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y ovino.

DOSIS
10 mg/Kg p.v. (equivalente a 1 ml/30 Kg p.v.).
Únicamente para inyección subcutanea.
No administrar por vía intramuscular.
No administrar a corderos que pesen menos de 15 Kg.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones de las vías respiratorias, del pedero y de la mastitis aguda ovina.

ENFERMEDADES
Tratamiento de infecciones de las vías respiratorias causadas por *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*.
Tratamiento del pedero causado por *Dichelobacter nodosus* y *Fusobacterium necrophorum*.
Tratamiento de la mastitis aguda ovina causada por *Staphylococcus aureus* y *Mycoplasma agalactiae*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 42 días.
Leche: 18 días.
Si el producto se administra a ovejas durante el periodo de secado o a ovejas gestantes, la leche no debe usarse para el consumo humano hasta que hayan transcurrido 18 días después del parto.

LA INYECCIÓN DE TILMICOSINA EN HUMANOS PUEDE SER MORTAL – EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA EVITAR LA AUTOINYECCIÓN ACCIDENTAL Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y LAS INDICACIONES DEL SPC DE FORMA PRECISA

TULAJECT® 100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino y porcino

Tulatromicina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Tulatromicina 100 mg.

PRESENTACIÓN
Vial de 100 ml y 250 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino y porcino.

DOSIS
Vía intramuscular.
Una única inyección intramuscular de 2,5 mg de tulatromicina/Kg p.v. (equivalente a 1 ml / 40 Kg p.v.) en el cuello.

INDICACIONES
Tratamiento de las primeras etapas de pododermatitis infecciosa (pedero) que requiere tratamiento sistémico.

ENFERMEDADES
Tratamiento de las primeras etapas de pododermatitis infecciosa (pedero) asociado con *Dichelobacter nodosus* virulento que requiere tratamiento sistémico.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 16 días.
Su uso no está autorizado en animales que producen leche para consumo humano.
No debe utilizarse en animales gestantes que estén destinadas a la producción de leche para consumo humano, durante los dos meses previos a la fecha prevista de parto.

ALAMYCIN® AEROSOL

Antibacteriano en aerosol tópico

Oxitetraciclina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Oxitetraciclina clorhídrate 32,1 mg/ml.

PRESENTACIÓN

Envase de 140 g.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino.

DOSIS

Antes de la administración del producto, el área afectada debería ser limpiada y los cascos rebajados. Aplicar con el brazo extendido, manteniendo el bote en posición vertical, y a una distancia de 10-15 cm, oprimir el pulsador durante un mínimo de 5 segundos o hasta que el área esté cubierta. En el tratamiento de los cascos, los bóvidos y óvidos tratados deberían ser mantenidos sobre suelo seco durante 1 hora, antes de permitirles volver a salir al pastizal. El producto normalmente está indicado para usarse en una sola sesión por administración tópica. Ocasionalmente puede requerirse una segunda administración.

INDICACIONES

Alamycin Aerosol está recomendado para uso tópico en el tratamiento de heridas quirúrgicas y superficiales, tratamiento coadyuvante del pedero y otras infecciones pódales.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.
En caso de sacrificio de urgencia, decomisar la zona tratada.

SPASMIPUR® 20 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino, porcino y equino

Butilbromuro de escopolamina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Butilbromuro de escopolamina 20 mg. (equivalente a 13,8 mg de escopolamina).

PRESENTACIÓN

Envases de 50 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS

0,7 mg /Kg p.v. - (equivalentes a 0,35 ml /10 Kg p.v.). Para reducir las contracciones del músculo liso en el tracto gastrointestinal o urinario (efecto espasmolítico). Para procedimientos clínicos (consultar las indicaciones de uso). Inyección lenta tanto por vía intravenosa como intramuscular.

INDICACIONES

Tratamiento de espasmos agudos del tracto gastrointestinal (cólico) y urinario.
Como ayuda en procedimientos en los que se requiere una menor actividad peristáltica del tracto gastrointestinal o una disminución de las contracciones en el tracto urinario.

ENFERMEDADES

Cólico gastrointestinal y/o urinario.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 18 días.
Leche: 12 horas.

CLOSAMECTIN®
5 mg/ml – 125 mg/ml
Solución inyectable para bovino y ovino

Ivermectina y Closantel

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Ivermectina 5 mg y Closantel 125 mg. (equivalente a 135,9 mg de dihidrato sódico de closantel).

PRESENTACIÓN
Envases de 100 ml y 500 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y ovino.

DOSIS
Ivermectina 200 µg/Kg p.v. y Closantel-5 mg/ Kg p.v. equivalente a 1 ml/ 25 Kg p.v. / vía subcutánea.
No usar por vía intravenosa o intramuscular.

INDICACIONES
Para el tratamiento de infestaciones mixtas de trematodos (*Fasciola spp*). y nemátodos o artrópodos debidas a vermes redondos gastrointestinales, trematodos, vermes pulmonares, reznos nasales y ácaros de ovinos.

ENFERMEDADES
Vermes redondos gastrointestinales: *Teladorsagia circumcincta* (incluyendo L4 inhibidos), *Teladorsagia trifurcata* (adultos y L4), *Haemonchus contortus* (incluyendo L4 inhibidos), *Trichostrongylus axei* (adultos), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos y L4), *T. vitrinus* (adultos), *Cooperia curticei* (adultos y L4), *Oesophagostomum columbianum* (adultos y L4), *O. venulosum* (adultos), *Chabertia ovina* (adultos y L4), *Nematodirus filicollis* (adultos y L4), *Trichuris ovis* (adultos). [L4 = Cuarto estado larvario]
Vermes pulmonares: *Dictyocaulus filarias* (adultos y cuarto estadio larvario) *Protostrongylus rufescens* (adultos) *Fasciola hepática* (adultos y formas inmaduras de 7 semanas) *Fasciola gigantica*, *Fasciola hepatica*.
Reznos nasales: *Oestrus ovis*.
Ácaros de la sarna: *Psoroptes ovis*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 28 días.
Leche: Su uso no está autorizado en ovejas cuya leche se utiliza para consumo humano, incluso durante el periodo de secado. No usar durante el año anterior al primer parto de ovejas destinadas a producir leche para consumo humano.

OTROS DATOS
En el tratamiento de la sarna ovina psoróptica (sarna ovina), con una inyección de este medicamento no será suficiente para la eliminación de todos los ácaros. Se debe administrar un medicamento inyectable que contenga sólo ivermectina siete días después del tratamiento con este medicamento para tratar los signos clínicos y eliminar los ácaros.

NOROMECTIN® 10 mg/ml

Solución inyectable para ovino

Ivermectina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Ivermectina 10 mg.

PRESENTACIÓN

Envases de 50 ml, 250 ml, 500 ml y 1 L.

ESPECIES DE DESTINO

Ovino.

DOSIS

Dosis de 200 µg/Kg p.v. equivalente a 0,5 ml/25 Kg p.v.
Vía subcutánea en el cuello.

INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de las infecciones producidas por las siguientes especies de vermes redondos gastrointestinales, vermes pulmonares, reznos nasales y sarna psoróptica (sarna ovina).

ENFERMEDADES

Vermes redondos gastrointestinales (adultos y cuarto estadio larvario): *Ostertagia circumcincta* (inlcuyendo las larvas inhibidas), *Haemonchus contortus* (inlcuyendo las larvas inhibidas), *Trichostrongylus axei* (adultos), *Trichostrongylus colubriformis* (adultos), *Trichostrongylus vitrinus* (adultos), *Cooperia curticei*, *Nematodirus filicollis*.
Vermes pulmonares: *Dictyocaulus filaria* (adultos y cuarto estadio larvario).
Reznos nasales: *Oestrus ovis* (todos los estadios larvarios)
Ácaros de la sarna: *Psoroptes ovis.*

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 42 días.
Leche: No usar en ovejas en lactación que producen leche para consumo humano. No usar en ovejas en periodo de secado durante los 60 días previos al parto.

OTRA INFORMACIÓN

Para el tratamiento de *Psoroptes ovis* (sarna ovina), se requieren dos inyecciones con 7 días de intervalo para tratar los signos clínicos de la sarna y para eliminar los ácaros vivos. Se recomienda administrar la segunda inyección en el lado opuesto del cuello donde se administró la primera inyección.

NOROMECTIN® DRENCH 0,8 mg/ml

Solución oral para ovino

Ivermectina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Ivermectina 0,8 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 L, 2,5 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Ovino.

DOSIS
Dosis de 200 µg/Kg p.v. equivalente a 1 ml/4 Kg p.v.
Vía Oral.

INDICACIONES
El medicamento está indicado para el tratamiento y control de nematodos gastrointestinales, vermes pulmonares y reznos nasales de los ovinos.

ENFERMEDADES
Vermes gastrointestinales:
Haemonchus contortus (Adulta, L4 y L4 inhibida), *Ostertagia* (Teladorsagia) *circumcincta* (Adulta, L4 y L4 inhibida), *Trichostrongylus axei* (Adulta y L4), *Trichostrongylus colubriformis* (Adulta y L4), *Trichostrongylus vitrinus* (Adulta y L4), *Cooperia curticei* (Adulta y L4), *Cooperia oncophora* (Adulta y L4), *Nematodirus battus* (Adulta y L4), *Nematodirus filicollis* (Adulta y L4), *Nematodirus spathiger* (Adulta y L4), *Strongyloides papillosus* (Adulta y L4), *Oesophagostomum columbianum* (Adulta y L4), *Oesophagostomum venulosum* (Adulta y L4) y *Chabertia ovina adulta*.
Los estadios larvarios inhibidos y resistentes a los bencimidazoles de cepas de H. contortus y *Ostertagia (Teladorsagia) circumcincta* también son controlados.
Vermes pulmonares (adultos e inmaduros):
Dictyocaulus filaria.
Reznos nasales (todos los estadios larvarios):
Oestrus ovis

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 10 días.
Leche: No usar en ovejas en lactación que producen leche para consumo humano. No usar en ovejas en periodo de secado durante los 60 días previos al parto.

SPOTINOR® 10 mg/ml

Solución spot-on para bovino y ovino

Deltametrina

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN
Deltametrina 10 mg.

PRESENTACIÓN
Envases de 500 ml, 1 L y 2,5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino y ovino.

DOSIS
Adultos 50 mg/animal correspondiente a 5 ml/animal.
Corderos (de menos de 10 Kg p.v. o 1 mes de edad): 25 mg/animal correspondiente a 2,5 ml/animal.
Administración: aplicar una dosis única con el pack dispensador especial "Squeeze 'n' Pour" o el Aplicador Spot-On en un solo punto sobre la línea media de la espalda a nivel de los hombros.

INDICACIONES
Para el tratamiento y prevención de infestaciones de garrapatas, piojos, melófagos e infestaciones cutáneas por larvas de moscas en ovino y piojos y garrapatas en corderos.

ENFERMEDADES
Ovino: Para el tratamiento y prevención de infestaciones por garrapatas *Ixodes ricinus* y por piojos (*Linognathus ovillus, Bovicola ovis*), melófagos *(Melophagus ovinus)* e infestaciones cutáneas por larvas de moscas (normalmente *Lucilia spp*).
Corderos: Para el tratamiento y prevención de infestaciones por garrapatas *Ixodes ricinus* y por piojos, *Bovicola ovis*.

TIEMPO DE ESPERA
Carne: 35 días.
Leche: Su uso no esta autorizado en ovejas cuya leche se utiliza para consumo humano.

CALMAFUSION 380mg / 60mg / 50mg

Solución para perfusión
para bovino, ovino y porcino

Gluconato de calcio, cloruro de magnesio y ácido bórico 50 mg

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Gluconato de calcio para soluciones inyectables 380 mg (equivalente a 34,0 mg o 0,85 mmol de Ca^{2+}) Cloruro de magnesio hexahidratado 60 mg (equivalente a 7,2 mg o 0,30 mmol de Mg^{2+}) Ácido bórico 50 mg.

PRESENTACIÓN

Envases de 500ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, porcino.

DOSIS

Administrar 10 – 14 mg Ca^{2+} (0,26 – 0,34 mmol Ca^{2+}) y 2,2 – 2,9 mg Mg^{2+} (0,09 – 0,12 mmol Mg^{2+}) por Kg p.v. correspondiente a 0,3 – 0,4 ml del medicamento veterinario por 1 Kg p.v.
Para infusiones intravenosas lentas, se recomienda administración durante un periodo de 20 - 30 minutos.
Los volúmenes más pequeños (menos de 50 ml) deben administrarse mediante una jeringa estéril o una bomba de infusión de jeringa.

INDICACIONES

Para el tratamiento de la hipocalcemia aguda complicada por una deficiencia de magnesio.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días.
Leche: 0 horas.

CITRON

Repelente de insectos de uso en animales

Aceites esenciales

COMPOSICIÓN

Aceites esenciales de Eucalyptus Citriodora y Geraniol.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 L.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino y equino.

DOSIS

Ovino/Caprino: 5 - 10 ml

INDICACIONES

Citron es un insecticida natural que procura una protección frente a la mosca tipo *Lucillia Sericata* y *Wolhfartia magnifica*, principales responsables de la miasis en rumiantes.
El tratamiento para la erradicación de miasis, ha sido probado en ovejas afectadas por la presencia de gusanos procedentes de mosca *Lucilia sericata* durante largos períodos.
Control de garrapatas, malófagos, insectos voladores, ácaros, mosquitos y piojos *Damanila bovis* y *Linognatus vituli*.

ENFERMEDADES

Repelente de garrapatas, ácaros, piojos y de insectos voladores (moscas y mosquitos).
Control de *Lucilia sericata*, *Wohlfahrtia magnifica*, *Damalia bovis* y *Linognatus vituli*.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

KARIDIET PRO

Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico para apoyar la digestión fisiológica.

Plantago ovata

COMPOSICIÓN

Plantago ovata 27%, dextrosa y electrolitos.

PRESENTACIÓN

Bote de 1 Kg.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino y equino.

DOSIS

Administrar 3 tomas con un intervalo de 12 h con el producto disuelto en agua o/y leche (lactoreemplazante) a 40 ºC.
Mezclar y dar al animal inmediatamente antes que la solución gelifique.
Corderos y Cabritos:
25 g diluidos en 500 ml máximo por toma.

INDICACIONES

Se recomienda consultar a un veterinario antes de utilizarlo o de prolongar su período de utilización.
Complemento nutricional que contiene electrolitos, hidratos de carbono y *Plantago ovata* para la prevención y tratamiento de trastornos digestivos (diarrea), pudiéndose utilizar conjuntamente con la leche (lactoreemplazante) durante la convalecencia.
Regula el transito intestinal y asegura una alimentación hídrica y energética durante periodos breves (36 a 48 horas).

ENFERMEDADES

Trastornos digestivos causados por patógenos o toxinas.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

OTROS DATOS

- Administrar 3 tomas en intervalos de 12 horas
- Suministrar después de los primeros signos de diarrea, hasta que los síntomas hayan desaparecido.
- El tiempo entre preparación y la toma, debe ser inmediato (preparar delante del animal a tratar), antes de que la solución gelifique.
- Se recomienda dar las dos primeras tomas con agua y la tercera con leche o lactoreemplazante.
- El animal debe tener siempre agua limpia a disposición.

GASTRO K GEL

Carbón activado para bovino, ovino, caprino, porcino y equino

COMPOSICIÓN

Carbón vegetal de roble, glicerina, hojas secas molturadas, cloruro sódico y cloruro potásico

PRESENTACIÓN

Cartucho de 285 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino y equino.

DOSIS

Ovino y Caprino:
Adultos: 30 ml (2 pulsaciones) dos veces al día, durante 2 días, si fuera necesario.
Corderos y cabritos: 15 ml (1 pulsaciones) dos veces al día, durante 2 días, si fuera necesario.
Uso oral. Utilizar el cartucho con una pistola adecuada.
Sujetar con delicadeza la cabeza del animal, poner la apertura del cartucho dentro de la boca, y luego presionar. Cada pulsación suministra 15 ml.

INDICACIONES

Mejora la salud intestinal.
Previene y disminuye la diarrea.
Protege las mucosas intestinales.
Favorece la captación de nutrientes.

ENFERMEDADES

Diarreas inespecificas.
Diarreas mecánicas.
Intoxicaciones alimentarias.

TIEMPO DE ESPERA

No procede.

KARIHIDRA LIQUIDO

Estabilizador hídrico y electrolítico para terneros, corderos, cabritos, lechones y potrillos

COMPOSICIÓN
Dextrosa, cloruro sódico y fosfato monocálcico.

PRESENTACIÓN
Envases de 1 L y 5 L.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
0,5 a 1L de dilución por cordero/cabrito por día con una concentración de 75ml de Karihidra Liquido/L de agua repartidos en varias tomas. Se recomienda una utilización de 1 a 7 días.

INDICACIONES
Estabilizador del equilibrio hídrico y electrolítico.

ENFERMEDADES
Diarrea y deshidratación.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

K-LOSTRUM

Suplemento del calostro para terneros, corderos y cabritos

COMPOSICIÓN
Lactosa, calostro, dextrosa y paredes celulares de *saccharomyces cerevisiae*.

PRESENTACIÓN
Envases de 100 g x 10 sobres.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino y caprino.

DOSIS
Administrar K-Lostrum lo más rápidamente posible en las 24 primeras horas siguientes al nacimiento:
- Como complemento del calostro maternal: 25 g/cordero / cabrito
- Como substituto del calostro maternal: 50 g/cordero / cabrito

Temperatura del agua para la mezcla: 40 ºC.

INDICACIONES
K-Lostrum es un suplemento del calostro (en parte procedente de calostro liofilizado) con un alto porcentaje de Igs, proveniente de rebaños de especie bovina libre de IBR y tuberculosis para terneros, corderos y cabritos.
K-Lostrum puede ser utilizado tanto para sustituir el calostro maternal como para complementar calostros de baja calidad y así evitar fallos en la transferencia de inmunidad pasiva.

¡VENTAJAS
Alto porcentaje en Immunoglubinas (Igs): 11%.
De las cuales un 9% son IgG.
Puede utilizarse como sustituto del calostro materno.
Hace más efectiva y completa la transferencia de inmunidad en calostros de baja calidad como complemento.
Fácil de mezclar.
Garantía de energía y vitalidad.
Composición muy completa que aporta los nutrientes necesarios en el neonato.
Fácil de conservar.
Estabiliza la flora y la mucosa intestinal (prebióticos y betaina).

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

ULCERPROTEK
Emulsión líquida de origen natural

COMPOSICIÓN
Aceites esenciales de áloe vera
y ácido glutámico.

PRESENTACIÓN
Cubos de 4 Kg.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, caprino, porcino y equino.

DOSIS
1g/10 Kg p.v. durante 7-9 días.

INDICACIONES
Astringente manteniendo la ulcera limpia.
Genera una cobertura resistente.
Estimula la regeneración celular.
Cicatrizante.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

ALUNIVET AEROSOL

Aerosol de aluminio micronizado
para bovino, ovino, porcino y equino
Aluminio micronizado

COMPOSICIÓN
Aluminio micronizado.

PRESENTACIÓN
Envase de 200 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
Aplicar sobre la piel limpia y seca a una distancia de 10 a 20 cm.

INDICACIONES
Crea un escudo de protección y estimula la rápida recuperación de los defectos en la piel, como cortes y escoriaciones.
Protege la zona dañada como un vendaje.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

VETERZINC

Aerosol de óxido de zinc para bovino, ovino, porcino y equino

Oxido de zinc

COMPOSICIÓN
Oxido de zinc.

PRESENTACIÓN
Envases de 200 ml.

ESPECIES DE DESTINO
Bovino, ovino, porcino y equino.

DOSIS
Aplicar sobre la piel limpia y seca a una distancia de 10 a 20 cm del área a cubrir.

INDICACIONES
Funciona como un vendaje de pomada, mantiene la piel elástica y tiene un efecto protector excelente.
Se puede utilizar como revestimiento protector.

TIEMPO DE ESPERA
No procede.

VETBUTON® 100 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino, caprino, porcino y equinos

Menbutona

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN

Menbutona 100 mg.

PRESENTACIÓN

1 vial de 100 ml.

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino, caprino, porcino y equino.

DOSIS

10 mg/Kg p.v.- vía IM profunda o IV lenta, equivalente a 1 ml/10 Kg p.v.
La administración se puede repetir una vez después de 24 horas en caso necesario.

INDICACIONES

Estimulación de la actividad hepatodigestiva en caso de trastornos digestivos e insuficiencia hepática.

- Indigestiones.
- Cólicos.
- Estreñimiento.
- Anorexia.
- Toxemias.
- Intoxicaciones.
- Cetosis.

Insuficiencias hepática y pancreática.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 0 días.
Leche: 0 días.

Para más información sobre los productos listados consultar el prospecto.

PUBLI00166_04/2022

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com

ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.