ANTIBIÓTICOS KARIZOO

Marbofloxoral

20 y 80 mg Comprimidos para perros

Marbofloxacino

20 y 80 mg
100 comprimidos

Enrotab

50 y 150 mg Comprimidos para perros

Enrofloxacino

50 y 150 mg
20 comprimidos

Betafuse

1 mg/g + 5 mg/g Gel para perros

Ácido fusidico y Betametasona

Gel tópico

Norbrook®

Noroclav

50, 250 y 500 mg Comprimidos para perros y gatos

Amoxicilina y Ácido Clavulánico

50, 250 y 500 mg
Comprimidos

Norbrook®

Noroclav

175 mg Suspensión Inyectable

Amoxicilina y Ácido Clavulánico

50 ml inyectable

Norbrook®

Marbofloxoral 20 y 80 mg. Comprimidos para perros. Principio activo: Marbofloxacino. **Especies de destino:** perros **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles al marbofloxacino en Pioderma superficial o profunda, infecciones del tracto urinario asociadas o no a prostatitis y/o epididimitis e infecciones respiratorias. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en perros de razas grandes de menos de 12 meses de edad. No usar en animales epilépticos ante la ausencia de datos en estos casos. **Posología y vía de administración:** vía oral 2 mg/kg. **Titular de la autorización de la comercialización:** Fatro Ibérica S.L. C/ Constitución 1, Planta baja 3 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) **Nº registro** Marbofloxoral 20 mg: 2724ESP. Marbofloxoral 80 mg: 2725ESP. / **Enrotab 50 y 150 mg.Comprimidos para perros. Principio activo:** Enrofloxacino. **Especies de destino:** perros. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones de vías urinarias inferiores (asociado o no con prostatitis) e infecciones de vías urinarias superiores causadas por *Escherichia coli* o *Proteus mirabilis.* Tratamiento de pioderma superficial y profunda. **Contraindicaciones:** No usar en cachorros o en perros en crecimiento (perros de menos de 12 meses en razas pequeñas o de menos de 18 meses en razas grandes). No administrar a perros que tengan desordenes nerviosos. No usar en perros en caso de hipersensibilidad conocida a las fluoroquinolonas o a algún excipiente del medicamento veterinario. No utilizar en caso de resistencia a las quinolonas, ya que puede existir resistencia cruzada casi completa con otras quinolonas y resistencia cruzada completa con otras fluoroquinolonas. No usar junto a tetraciclinas, fenicoles o macrólidos debido a efectos antagónicos potenciales. **Posología y vía de administración:** vía oral, 5mg/kg/día. **Titular de la autorización de comercialización:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania 8. **Nº registro:** 2215ESP y 2216ESP. / **Betafuse 1mg/g + 5 mg/g. Gel para perros. Principio activo:** cada gramo de betafuse contiene 1 mg de Betametasona y 5 mg de ácido fusídico. **Especie de destino:** perros. **Indicaciones**: tratamiento de pioderma de superficie como la dermatitis húmeda aguda (máculas o puntos calientes) y el Intertrigo (dermatitis de los pliegues) causadas por gérmenes sensibles al ácido fusídico. **Contraindicaciones:** no usar en piodermas profundas, no usar en furunculosis piotraumática con lesiones satélites de pápulas y/o pustulas, no usar en presencia de infección fúngica, viral o demodicosis, no aplicar en ojos, no aplicar en áreas extensas, no usar en perros con impétigo, no usar en perros con síndrome de Cushing o diabetes mellitus, no usar en perros con pancreatitis ni con úlceras gastrointestinales. No usar en perras gestantes ni lactantes. **Periodo de validez:** una vez abierto el envase 8 semanas. **Titular de la autorización de comercialización:** Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, County Down Irlanda del Norte BT35 6JP Nº autorización de comercialización: 3483 ESP **Producto de uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria**. / **Noroclav Comprimidos: Principio activo:** Amoxicilina y Ac. Clavulánico 50, 250 y 500 mg. **Especies de destino:** perros y gatos. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones respiratorias, de piel, tracto urinario y tejidos blandos, provocadas por cepas productoras de betalactamasas y sensibles a la combinación Amoxicilina y Ácido Clavulánico. **Posología:** 12,5 mg/kg dos veces al día. No usar en animales hipersensibles a las penicilinas u otros betalactámicos. No usar en conejos, jerbos, cobayas Nº Registro: 1571ESP, 1572ESP, 1801ESP. **Titular de la autorización de comercialización:** Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP, Co. Down, Irlanda del Norte. / **Noroclav Inyectable: Principio activo:** Amoxicilina y Ac. Clavulánico175 mg. **Especies de destino:** perros. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones respiratorias, de piel, tracto urinario y tejidos blandos, provocadas por cepas productoras de betalactamasas y sensibles a la combinación Amoxicilina y Ácido Clavulánico. **Posología:** 8,75 mg/kg una vez al día. No usar en animales hipersensibles a las penicilinas u otros betalactamicos. No usar en conejos, jerbos, cobayas. Utilizar siempre jeringa y aguja seca. Nº Registro: 1582 ESP. **Titular de la autorización de comercialización:** Norbrook Laboratories Ltd, Station Works, Newry, BT35 6JP, Co. Down, Irlanda del Norte.

ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.

ANTIBIÓTICOS KARIZOO

Cepedox® vet

Comprimidos para perros y gatos
Doxiciclina

PRINCIPIO ACTIVO
Doxiciclina (50, 200 y 400 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Perros y gatos.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones causadas por bacterias sensibles a la doxiciclina.
Perros: Rinitis provocada por *Bordetella bronchiseptica* y *Pasteurella* spp.; Bronconeumonía provocada por *Bordetella* spp. y *Pasteurella* spp.; Nefritis intersticial provocada por *Leptospira* spp.
Gatos: Infecciones respiratorias provocadas por *Bordetella bronchiseptica, Chlamydophila felis* y *Pasteurella spp.*

POSOLOGÍA
Dosis recomendada 10 mg/día, en una o dos tomas diarias acompañadas de comida.
En perros con nefritis intersticial el tiempo de duración del tratamiento ha de ser 14 días y en gatos con C. felis el tratamiento ha de ser durante 30 días

PRESENTACIÓN
Tres concentraciones diferentes:
50, 200 y 400 mg
Los envases contienen 100 comprimidos palatables y divisibles en 2 ó 4 partes.

Metrozenil

Comprimidos para perros y gatos
Metronidazol

PRINCIPIO ACTIVO
Metronidazol (250 y 500 mg).

ESPECIES DE DESTINO
Perros y gatos.

INDICACIONES
Tratamiento de infecciones gastrointestinales provocadas por Giardia spp y Clostridia spp, tratamientos del tracto urogenital, cavidad oral, garganta y piel causadas por bacterias anaerobias estrictas sensibles a metronidazol.

POSOLOGÍA
Vía oral. 50 mg/kg/día divido en 2 tomas de 25 mg durante 5-7 dias

PRESENTACIÓN
Envases conteniendo 10 blísteres de 10 comprimidos.
Los comprimidos son palatables y divisibles en 2 y 4 partes iguales.

Cepedox vet (50, 200 y 400 mg): Principio activo: Doxiciclina hiclato. **Especies destino:** perros y gatos. **Indicaciones:** infecciones causadas por gérmenes sensibles a Doxiciclina. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a tetraciclinas o algún excipiente. **Dosificación:** 10 mg/kg al día en una ó 2 tomas, siempre acompañado de comida. En perros con nefritis intersticial 15 días, en gatos con C.felis 30 días. **Titular de la comercialización:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania. **Nº registro:** 3920ESP, 3921ESP y 3922ESP. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria**. **Administración bajo control o supervisión del veterinario**.
Metrozenil Principio activo: metronidazol 250 y 500 mg. **Especie de destino:** Perros y gatos. **Indicaciones:** Infecciones gastrointestinales causadas por Giardia spp y Clostridia spp., infecciones del tracto urogenital, cavidad bucal, garganta y piel causadas por gérmenes anaerobios estrictos sensibles a metronidazol. **Posología:** vía oral 50 mg/kg/día dividido en dos tomas de 25 mg/kg. Envases conteniendo 100comprimidos. **Nº autorización comercialización:** 4.008ESP. **Titular comercialización:** Vet-Agro Multi-Trade Company Sp. z o.o. Gliniana 32, 20-616 Lublin, Polonia. **Medicamento sujeto a prescripcion veterinaria**.

900233_11/2021

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company
Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain
T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@alivira.es
www.alivira.es

ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.