

Karidox



500 mg/g polvo para administración en agua de bebida para porcino pollos y pavos
Doxiciclina

TRATAMIENTO DE
ENFERMEDADES
RESPIRATORIAS



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIDOX S.A.

Karidox



500 mg/g polvo para administración en agua de bebida para porcino pollos y pavos
Doxiciclina

Doxiciclina en polvo para el tratamiento de problemas respiratorios en porcino, pollos y pavos



Pollos de engorde



Porcino



Pavos

INDICACIONES

Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas por cepas de *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles a la doxiciclina

Tratamiento de infecciones respiratorias clínicas asociadas a *Mycoplasma gallisepticum* sensible a la doxiciclina.

POSOLOGIA

Uso en agua de bebida

23,1 mg de doxiciclina hclato /Kg p.v. al día (equivalente a 40,0 mg de medicamento por Kg p.v.), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos.

28,8 mg de doxiciclina hclato por Kg p.v. al día (equivalente a 50,0 mg de medicamento por Kg p.v.), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos.

TIEMPO ESPERA

Carne: 5 días
Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano

Carne: 4 días

Carne: 12 días

FORMATO

Bolsa de 200 g / Bolsa de 1 Kg

Karidox 500 mg/g polvo para administración en agua de bebida para porcino pollos y pavos **Sustancia activa:** Doxiciclina 500,0 mg (equivalente a Doxiciclina hclato 560,0 mg) **Especies de destino** Porcino (cerdos de engorde), Aves (pollos de engorde y reproductores) y Aves (pavos de engorde y reproductores). **Indicaciones de uso, especificando las especies de destino** Porcino: tratamiento de infecciones respiratorias clínicas causadas por cepas de *Mycoplasma hyopneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles a la doxiciclina. Aves (Pollos y pavos): tratamiento de infecciones respiratorias clínicas asociadas a *Mycoplasma gallisepticum* sensible a la doxiciclina. **Posología y vía de administración** Uso en agua de bebida. En cerdos y pollos, 23,1 mg de doxiciclina hclato /Kg p.v. al día (equivalente a 40,0 mg de medicamento por Kg p.v.), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos. En pavos, 28,8 mg de doxiciclina hclato por Kg p.v. al día (equivalente a 50,0 mg de medicamento por Kg p.v.), administrado en el agua de bebida durante 5 días consecutivos. **Tiempo(s) de espera** Porcino Carne: 4 días Aves (Pollos) Carne: 5 días Aves (Pavos) Carne: 12 días Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. **Propiedades farmacológicas** Grupo farmacoterapéutico: Antibacteriano para uso sistémico, Tetraciclinas. Doxiciclina Código ATCvet: QJ01AA02. **Formato:** Bolsa de 200 g. Bolsa de 1 Kg. **Titular de la autorización de comercialización** Laboratorios Karizoo, S.A. Polígono Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 - Caldes de Montbui (Barcelona) España número de la autorización de comercialización: 2675/ESP **Prohibición de venta, dispensación y/o uso** Condiciones de dispensación: **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Condiciones de administración: **Administración bajo control o supervisión del veterinario.**

FICHA TÉCNICA COMPLETA

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com



ALIVIRA
LABORATORIOS KARIZOO S.A.