

Mepidor

20 mg/ml Solución inyectable para caballos



**ANESTÉSICO
LOCAL DE
ELECCIÓN
EN CABALLOS**



KARIZOO

Mepidor


20 mg/ml Solución inyectable para caballos

Principio activo: Hidrocloruro de Mepivacaina 2%.

Especie de destino: Caballos.

Indicaciones: Anestesia intraarticular (diagnóstico de cojeras) y epidural en caballos.

Posología: **Intraarticular:** 3-30 ml dependiendo de la articulación.
Epidural: 1-1,25ml / 100 kg. Hasta máximo 10ml / caballo.



Acción: Inicio rápido 2-4 minutos. Hasta 1 hora de duración.

Presentación: Envases conteniendo 6 viales de 10 ml.

MEPIDOR 20mg/ml. Solución inyectable para caballos. **Composición:** Hidrocloruro de Mepivacaina 20 mg/ml. **Indicaciones:** Anestesia intraarticular y epidural en caballos. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a anestésicos del grupo Amida o a algún excipiente. En hembras gestantes valorar Beneficio/riesgo. **Posología:** Intraarticular: 60-600 mg mepivacaina dependiendo de la articulación. Epidural: 0-0,25 mg/kg hasta un máximo de 10 ml caballo. **Tiempo de espera:** carne y leche 3 días. **Presentación:** envases conteniendo 6 frascos de 10 ml. **Nº registro:** 3611ESP **Titular de la autorización:** Richter pharma A G 46000Wels.Austria **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración exclusiva por el veterinario**