

# ANTIBIÓTICOS KARIZOO

## QUINOLONAS

# Marbofloxoral

20 y 80 mg Comprimidos para Perros  
*Marbofloxacin*



- **Principio activo:** Marbofloxacin 20 y 80 mg
- **Especies de destino:** Perros
- **Presentaciones:** Marbofloxoral 20 mg: 100 comprimidos  
Marbofloxoral 80 mg: 100 comprimidos
- **COMPRIMIDOS FRACCIONABLES EN 2 ó 4 PARTES**

**Marbofloxoral 20 y 80 mg, Comprimidos para perros.** Principio activo: Marbofloxacin. Especies de destino: perros. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones causadas por microorganismos sensibles al marbofloxacin en Pioderma superficial o profunda, infecciones del tracto urinario asociadas o no a prostatitis y/o epididimitis e infecciones respiratorias. **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa o a algún excipiente. No usar en perros de razas grandes de menos de 12 meses de edad. No usar en animales epilépticos ante la ausencia de datos en estos casos. **Posología y vía de administración:** vía oral 2 mg/kg. **Titular de la autorización de la comercialización:** Fatro Ibérica S.L. C/ Constitución 1, Planta baja 3 08960 Sant Just Desvern (Barcelona) **Nº registro** Marbofloxoral 20 mg: 2724ESP, Marbofloxoral 80 mg: 2725ESP

# Enrotab

5 mg Comprimidos para Perros  
*Enrofloxacin*



- **Principio activo:** Enrofloxacin 50 y 150 mg
- **Especies de destino:** Perros
- **Presentaciones:** Enrotab 50 mg: 20 comprimidos  
Enrotab 150 mg: 20 comprimidos

**Enrotab 50 y 150 mg, Comprimidos para perros.** Principio activo: Enrofloxacin. Especies de destino: perros. **Indicaciones:** Tratamiento de infecciones de vías urinarias inferiores (asociado o no con prostatitis) e infecciones de vías urinarias superiores causadas por *Escherichia coli* o *Proteus mirabilis*. Tratamiento de pioderma superficial y profunda. **Contraindicaciones:** No usar en cachorros o en perros en crecimiento (perros de menos de 12 meses en razas pequeñas o de menos de 18 meses en razas grandes). No administrar a perros que tengan disordinaciones renales. No usar en perros en caso de hipersensibilidad conocida a las fluoroquinolonas o a algún excipiente del medicamento veterinario. No utilizar en caso de resistencia a las quinolonas, ya que puede existir resistencia cruzada casi completa con otras quinolonas y resistencia cruzada completa con otras fluoroquinolonas. No usar junto a tetraciclinas, fenicoles o macrólidos debido a efectos antagonistas potenciales. **Posología y vía de administración:** vía oral, 5mg/kg/día. **Titular de la autorización de comercialización:** CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania B. **Nº registro:** 2215ESP y 2216ESP



KARIZOO