


Pimotab[®]

Comprimidos masticables para perros
Pimobendán



PRESENTACIONES MEJOR ADAPTADAS AL PESO DEL PACIENTE

 Envases de 100 comprimidos masticables
Comprimidos divisibles en 2 o 4 partes



KARIZOO

Pimotab®

Comprimidos masticables para perros
Pimobendán

INDICACIONES:



Tratamiento insuficiencia cardiaca canina

- Cardiopatías dilatadas
- Insuficiencias valvulares

PRESENTACIONES:



- 3 Concentraciones diferentes:
10, 5 y 2,5 mg.
- Envases conteniendo
10 Blisters de 10 Comprimidos.
- Comprimidos masticables divisibles
en 2 y 4 partes.

DOSIFICACIÓN:



- **0,2 - 0,6 mg/kg** repartida en 2 tomas.
- **Recomendable 0,5 mg/kg** repartida en 2 tomas 1 hora antes de las comidas

	Pimotab 2,5 mg		Pimotab 5 mg		Pimotab 10 mg	
	mañana	noche	mañana	noche	mañana	noche
2,5 kg	1/4	1/4				
5 kg	1/2	1/2				
10 kg	1	1				
15 kg			3/4	3/4		
20 kg			1	1		
30 kg					3/4	3/4
40 kg					1	1

PIMOTAB 2,5mg-5mg y 10 mg Comprimidos masticables para perros 3915ESP-3916ESP Y 3917ESP. Indicaciones: Tratamiento de la insuficiencia cardiaca congestiva canina causada por una cardiomiopatía dilatada o una insuficiencia valvular. **Posología:** La dosis debe administrarse por vía oral y dentro del rango comprendido entre 0,2 mg y 0,6 mg de pimobendán/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias. La dosis diaria preferible es 0,5 mg/kg de peso corporal, repartida en dos administraciones diarias (0,25 mg/kg de peso corporal cada una). Cada dosis debe administrarse aproximadamente una hora antes de las comidas. Los comprimidos masticables pueden dividirse en cuatro partes iguales con el fin de administrar la dosis exacta en función del peso corporal. El medicamento veterinario puede administrarse en combinación con un diurético como la furosemida. **Contraindicaciones** No usar pimobendán en cardiomiopatías hipertroficas o en enfermedades en las que no es posible una mejora del gasto cardíaco por motivos funcionales o anatómicos (p. ej., estenosis aórtica) No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. **Precauciones especiales** Debe medirse la glucemia de forma periódica durante el tratamiento en perros con diabetes mellitus. Puesto que pimobendán se metaboliza principalmente en el hígado, no debe administrarse a perros con insuficiencia hepática grave. Se recomienda un seguimiento de la función cardíaca y de la morfología en animales tratados con pimobendán. **Titular de la autorización de comercialización** CP Pharma Ostlandring 13 31303 Burgdorf Alemania **Representante del titular:** Laboratorios Karizoo, S.A. P. I. La Borda, Mas Pujades 11-12 08140 Caldes de Montbui (Barcelona). **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.**

Laboratorios Karizoo, s.a.
An Alivira Group Company

Polig. Industrial La Borda
Mas Pujades, 11-12
08140 Caldes de Montbui
Barcelona, Spain

T +34 938 654 148
F +34 938 654 648
karizoo@karizoo.com
www.karizoo.com



KARIZOO

