

Caniphedrin®

20 y 50 mg
Comprimidos para perros



PRINCIPIO ACTIVO

Hidrocloruro de efedrina.

ESPECIES DE DESTINO

Perros.

INDICACIONES

Tratamiento de la incontinencia urinaria asociada a la insuficiencia del esfínter uretral en perras ovariectomizadas.

DOSIFICACIÓN

La dosis inicial recomendada es de 2 mg de hidrocloruro de efedrina por kg de peso corporal durante los primeros 10 días del tratamiento. Cuando se haya conseguido el efecto deseado, la dosis se puede reducir a la mitad o más. La dosis mínima eficaz se debe mantener en el tratamiento a largo plazo.

PRESENTACIÓN

Caniphedrin 20 mg: envases conteniendo 100 comprimidos divisibles en 2 y/o 4.

Caniphedrin 50 mg: envases conteniendo 100 comprimidos divisibles en 2.

Caniphedrin® comprimidos para perros 20 y 50 mg: Principio activo: hidrocloruro de efedrina 20 y 50 mg. Especie de destino: perros. Indicaciones: Tratamiento de la incontinencia urinaria causada por la incompetencia del mecanismo del esfínter uretral en perras ovariectomizadas. Contraindicaciones: No usar en perros con enfermedad cardiovascular (miocardiopatía, taquiarritmia, hipertensión), hipertiroidismo, diabetes mellitus, insuficiencia renal o glaucoma. No usar de manera concomitante con narcóticos halogenados como halotano o metoxilurano. No usar en casos de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Posología: 2 mg de hidrocloruro de efedrina por kg de peso corporal al día durante los primeros 10 días del tratamiento. La dosis diaria puede dividirse. Cuando se haya conseguido el efecto deseado, la dosis se puede reducir a la mitad. La dosis mínima eficaz se debe mantener en el tratamiento a largo plazo. Presentación: envases conteniendo 100 comprimidos. Titular de la autorización de comercialización: Richter Pharma AG, Feldgasse 19, 4600 Wels, Austria. Registro nº: 3926 ESP. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administrar bajo control o supervisión veterinaria.